ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

DOI: <https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.26>

УДК 551.735.1+552.51+550.42

Результаты изучения вещественного состава и U-Pb (LA-ICP-MS) возраста детритовых цирконов из терригенных пород ванаварской и оскобинской свит Камовского свода Байкитской антеклизы

А.В. Плюснин^{1,2*}, З.Л. Мотова³, И.В. Афонин⁴, Е.М. Томилина⁵, Д.А. Староселец⁶, Е.Е. Белозеров⁷,
И.Р. Халиков⁷, М.В. Шалдыбин⁸, И.А. Яшин¹, В.А. Фомин³

¹ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть», Красноярск, Россия

²Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти», Альметьевск, Россия

³Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Россия

⁴Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия

⁵Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия

⁶ООО «ГудГео», Тюмень, Россия

⁷АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», Красноярск, Россия

⁸ОАО «ТомскНИПИнефть», Томск, Россия

В работе представлены результаты исследований песчаников ванаварской свиты венда, выделяемой в составе непского регионального стратиграфического горизонта и оскобинской свиты, тирского регионального стратиграфического горизонта, изученных по керну глубокой скважины Юр-92, расположенной в пределах Камовского свода Байкитской антеклизы Сибирской платформы. Приведено детальное литологическое описание керна суммарной мощностью 89 м. Для 13 проб песчаников проведены следующие исследования: петрографическое изучение шлифов, определение основных петрогенных оксидов, определение примесных и микропримесных элементов методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, геохронологические (U-Pb) исследования детритовых цирконов. Установлено, что разрез ванаварской свиты характеризуется терригенным составом. Оскобинская свита представлена терригенно-сульфатно-карбонатными породами и подразделяется на три пачки. По результатам петрографического анализа пород ванаварской и оскобинской свит, в целом, наблюдается сходство по степени их окатанности и сортировки обломочного материала, составу породообразующих и аксессуарных минералов, а также обломков пород, в числе которых определены кварциты, микросланцы и гранитоиды (метаморфические и магматические породы), глинистые породы, вероятно, аргиллиты. Вещественные составы всех изученных песчаников ванаварской и оскобинской свит соответствуют аркозам. Совокупность литогеохимических характеристик свидетельствует о том, что источником обломочного материала для отложений ванаварской свиты являлись преимущественно породы кислого состава, а для терригенных пород оскобинской свиты – породы кислого и среднего состава. U-Pb (LA-ICP-MS) возраст детритовых цирконов из терригенных пород ванаварской свиты позволяет предположить в качестве основного источника обломочного материала в бассейн их седиментации архей-раннепротерозойские породы фундамента Сибирской платформы. Седиментация оскобинской свиты происходила за счет разрушения архей-раннепротерозойских пород, слагающих фундамент Сибирской платформы, а также позднерифейских террейнов северного сегмента Центрально-Азиатского складчатого пояса и, возможно, при участии пород, слагающих Восточно-Ангарский блок Енисейского кряжа. Совокупность вещественных характеристик ванаварской и оскобинской свит, а также результаты изучения возраста детритовых цирконов, с учетом опубликованных данных о литолого-фациальных особенностях изученных пород, позволяют предположить, что седиментация ванаварской свиты происходила на пассивной окраине Сибирской платформы. Затем имела место трансформация в периферийный форландовый бассейн, в котором накапливались терригенные породы оскобинской свиты.

Ключевые слова: Сибирская платформа, Байкитская антеклиза, ванаварская свита, оскобинская свита, венд, литогеохимия, детритовые цирконы, палеогеодинамика

Для цитирования: Плюснин А.В., Мотова З.Л., Афонин И.В., Томилина Е.М., Староселец Д.А., Белозеров Е.Е., Халиков И.Р., Шалдыбин М.В., Яшин И.А., Фомин В.А. (2025). Результаты изучения вещественного состава и U-Pb (LA-ICP-MS) возраста детритовых цирконов из терригенных пород ванаварской и оскобинской свит Камовского свода Байкитской антеклизы. *Георесурсы*, 27(1), с. 236–260. <https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.26>

Введение

Камовский свод Байkitской антеклизы на юго-западе Сибирской платформы является одним из основных объектов поисков и разработки углеводородов в Красноярском крае. Промышленная продуктивность приурочена к породам рифейского и вендского комплексов осадочного чехла. Отложения венда залегают с размывом на разновозрастных толщах рифея и выступах фундамента. Стратиграфические перерывы установлены исследователями в подошве ванаварской свиты (непский горизонт), оскобинской свиты (тирский горизонт), а также катангской свиты (нижнеданиловский подгоризонт) (Решения четвертого межведомственного регионального совещания..., 1989; Мельников и др., 2005; Мельников 2018). Мощность отложений ванаварской и оскобинской свит постепенно увеличивается в юго-западном направлении. До настоящего времени выводы предшественников о возрасте и условиях седиментации терригенных отложений ванаварской и оскобинской свит, распространенных на Камовском своде Байkitской антеклизы, основывались на результатах межрегиональных стратиграфических корреляций, проведенных по керну поисково-оценочных скважин глубокого бурения, с учетом сейсморазведочных работ (Решения четвертого межведомственного регионального совещания..., 1989; Мельников и др., 2005; Мельников 2018; Макет региональной корреляционной стратиграфической схемы..., 2022). В настоящей работе приведены новые данные о результатах комплексного изучения терригенных пород ванаварской и оскобинской свит, включающие петрографические и литогеохимические исследования, а также результаты U-Pb (LA-ICP-MS) геохронологических исследований детритовых цирконов, отобранных из песчаников по керну скважины Юр-92 (рис. 1), пробуренной на территории Юрубчено-Тохомского месторождения углеводородов (УВ).

Настоящая работа является продолжением исследований вендских терригенных отложений непского и тирского региональных стратиграфических горизонтов,

распространенных на территории внутренних районов Сибирской платформы (Мотова и др., 2022; Плюснин и др., 2024).

Основная цель исследования заключается в реконструкции состава пород источников сноса терригенных отложений ванаварской (непский горизонт) и оскобинской (тирский горизонт) свит, распространенных в юго-западной части Камовского свода Байkitской антеклизы на основе петрографических, литогеохимических и U-Pb (LA-ICP-MS) методов исследований.

Краткие сведения о геологическом строении

Район исследования тектонически приурочен к Камовскому своду Байkitской антеклизы. В геологическом разрезе антеклизы выделяется кристаллический фундамент и несогласно залегающие на нем рифейские и венд-кембрийские терригенно-карбонатные породы осадочного чехла (рис. 2).

Породы кристаллического фундамента, в пределах Камовского свода, вскрыты при бурении скважин на территории Юрубчено-Тохомского массива на глубине 1.8–2.0 км в виде отдельных изолированных выходов среди разновозрастных рифейских осадочных пород.

В ходе петрографического изучения пород кристаллического фундамента по керну скважин были диагностированы однородные и порфиоровые гранитоиды, в разной степени разгнейсованные и прорванные телами габброидов и долеритов, а также плагиогнейсы. Возраст гранитоидов, по результатам U-Pb датирования цирконов, определен на уровне 2563 млн лет (Самсонов и др., 2021).

Комплекс пород рифея в районе исследования представлен терригенно-карбонатными толщами камовской серии, в составе которой выделяются (снизу вверх): вздрэшевская, мадринская, юрубченская, долготинская, куюмбинская, копчерская, юктэнская, рассолкинская, вингольдская, токурская и ирэмэкэнская толщи, с размывом залегающими на архейско-раннепротерозойском

Рис. 1. Район исследований (а) и фрагмент схемы тектонического районирования Сибирской платформы (б). Условные обозначения: 1 – границы Сибирской платформы; 2 – Енисейский край; 3 – выступы фундамента, закартированные по данным сейсморазведочных работ и глубокого бурения (Самсонов и др., 2021); 4 – гидросеть; 5 – границы Байkitской антеклизы; 6 – границы Камовского свода; 7 – местоположение изученной скважины.

фундаменте Сибирской платформы (Мельников и др., 2005; Краевский и др., 2018). Детальное описание толщ рифея опубликовано в работе (Фомин и др., 2024).

Возраст пород камовской серии до настоящего времени являлся предметом дискуссий. Изучение силла долеритов, прорывающего зону контакта в подошве камовской серии и раннепротерозойских гранитогнейсов фундамента Сибирской платформы, методом $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ (1499 ± 43 млн лет) (Khabarov et al., 2002) позволило ограничить время накопления камовской серии мезопротерозоем. Позднее были получены данные прямого

Pb-Pb датирования карбонатных пород камовской серии (Горохов и др., 2021, 2023), в ходе которых был установлен возраст нижних (мадринская, юрубченская, куюмбинская и вингольдская толщи – 1510 ± 50 млн лет) и верхних (ирэмэкэнская толща – 1490 ± 50 млн лет) горизонтов камовской серии. Кроме того, установленные данные модельного Rb-Sr возраста глауконитов долгоктинской свиты предполагают время раннего диагенеза осадков нижней части камовской серии древнее $1340\text{--}1400$ млн лет (Зайцева и др., 2019). Таким образом, опубликованные данные о возрасте пород камовской серии позволяют

Рис. 2. Стратиграфическая колонка рифейских и вендских пород Байкитской антеклизы (Khabarov et al., 2011; Харахинов и др., 2011; с изменениями). Условные обозначения: 1 – известняки; 2 – ангидритизированные доломиты; 3 – пелоидные доломиты; 4 – песчаные и песчаные доломиты; 5 – глинистые доломиты; 6 – строматолитовые доломиты; 7 – окремненные доломиты; 8 – песчаники; 9 – алевролиты; 10 – аргиллиты; 11 – ангидриты; 12 – граниты; 13 – силлы долеритов; 14 – несогласия; 15 – точки геохронологических исследований: а – U-Pb датирования цирконов; б – $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$; в – Pb-Pb датирования карбонатных пород; г – Rb-Sr возраст глауконитов.

предположить время их седиментации не древнее раннего мезопротерозоя, в соответствии с Международной хроностратиграфической шкалой (Cohen et al., 2022), или нижнего рифея, согласно Общей стратиграфической шкалы (Общая стратиграфическая шкала, 2024).

Вендские отложения на территории исследований несогласно перекрывают различные стратиграфические уровни рифея. Отложения венда представлены терригенно-карбонатными породами, выделяемыми в составе непского, тирского и даниловского региональных стратиграфических горизонтов (Решения четвертого межведомственного регионального совещания..., 1989).

Изученные породы по керну из скважины Юр-92, расположенной в Тайгинской фациальной зоне восточной части Байкитской антеклизы (Макет региональной корреляционной стратиграфической схемы..., 2022), представлены отложениями ванаварской свиты непского регионального стратиграфического горизонта и оскобинской свиты тирского регионального стратиграфического горизонта.

Ванаварская свита названа по пос. Ванава, Красноярского края. Стратотип свиты выделен в скв. Ванаварская 1, в интервале 3115–3230 м и приурочен к Катангской фациальной зоне, где подразделяется на две подсвиты (Решения четвертого межведомственного регионального совещания..., 1989). Отложения свиты в Тайгинской зоне не разделены на подсвиты. В основании свиты в ряде скважин залегают галечные брекчии кремнистых пород и аргиллиты с линзами кремней. Выше наблюдается переслаивание пластов пестроцветных аргиллитов, алевролитов и песчаников. В строении разреза ванаварской свиты преобладают мелкозернистые кварцевые песчаники с глинистым и регенерационным кварцевым цементом при подчиненном развитии полевошпатовых песчаников, аргиллитов. Мощность свиты достигает 145 м. Литолого-фациальные особенности терригенных пород ванаварской свиты указывают на их накопление в участках палеодолин и палеодельт, а также на территориях высокой динамики вод в континентальных и прибрежно-морских обстановках (Решения четвертого межведомственного регионального совещания..., 1989).

Выше по разрезу со стратиграфическим перерывом залегают оскобинская свита, соответствующая тирскому региональному горизонту. Оскобинская свита названа по р. Оскоба. Стратотип выделен в Оскобинской параметрической скважине 1 (Мельников, 1982). В стратотипическом разрезе породы свиты подразделяются на три пачки. Нижняя пачка представлена переслаиванием терригенных и глинисто-карбонатно-сульфатных пород. Средняя пачка сложена терригенными породами. В верхней пачке залегают карбонатные и глинисто-карбонатно-сульфатные, переслаивающиеся между собой породы. Общая мощность оскобинской свиты в Тайгинской фациальной зоне составляет 95 м (Макет региональной корреляционной стратиграфической схемы..., 2022). Литолого-фациальные характеристики пород свиты свидетельствуют об их формировании в приливно-отливных и лагунных обстановках (Мельников, 1982).

Выше, со стратиграфическим перерывом залегают преимущественно карбонатные породы катангской, собинской и тэтэрской свит, выделяемых в составе даниловского

регионального стратиграфического горизонта (Решения четвертого межведомственного регионального совещания..., 1989).

Фактический материал и методы исследования

Объектом исследования стали сульфатно-карбонатно-терригенные отложения ванаварской и оскобинской свит, изученные в разрезе скважины Юр-92, пробуренной на территории Юрубчено-Тохомского месторождения. Основой для анализа каротажных диаграмм послужили результаты геофизических исследований скважин, а именно гамма-каротажа (ГК) и нейтрон-нейтронного каротажа с регистрацией тепловых нейтронов (ННКт), позволившие произвести расчленение разреза (рис. 3) посредством применения метода скважинной геологической корреляции (Методические рекомендации..., 2013).

Для аналитических исследований из керна скв. Юр-92 проведен отбор образцов (13 шт) песчаников и алевролитов ванаварской и оскобинской свит. Места отбора образцов керна отмечены на сводном геолого-геофизическом разрезе скважины (рис. 3).

В керне изученной скважины ванаварская свита залегает в интервале 2441–2479 м (мощность 38 м), вынос керна в интервале ванаварской свиты 2441–2472 м (31 м, 84%). Нижняя пачка оскобинской свиты залегает в интервале 2404–2441 м (мощность 37 м), вынос керна 100%. Средняя пачка оскобинской свиты залегает в интервале 2396–2404 м (мощность 8 м), вынос керна 100%. Верхняя пачка оскобинской свиты залегает в интервале 2365–2396 м (мощность 31 м), вынос керна в интервале 2383–2396 м (13 м, 42%). Суммарный вынос керна по скважине составил 89 м (рис. 3).

Петрографическое изучение шлифов проведено на поляризационном микроскопе Olympus BX51 (Olympus Optical Co., Япония) в проходящем свете с использованием методов скрещенных николей по методике НСОММИ МР № 184. Снимки шлифов производились в проходящем свете и в скрещенных николях.

Аналитические работы проведены с использованием оборудования Томского регионального центра коллективного пользования Национального исследовательского Томского государственного университета. Определение основных петрогенных оксидов производилось по методике «НСАМ 487-ХС» (Tompson et al., 1988) (аналитики: Е.И. Никитина, М.Ю. Власкина). Анализ выполнялся методом ISP-MS на эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной плазмой (Termo Fisher Scientific, США) с использованием внутреннего стандарта (Sc Scandium Standard, Merck, Германия). Определение примесных и микропримесных элементов (с содержанием <5%) проведено с использованием аттестованной методики определения элементов методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой согласно методике СТО ТГУ 048-2012 (Хрущева и др., 2019) (аналитик: Е.С. Рабцевич). Пределы обнаружения следовых количеств элементов составляют 0.001 г/т. Анализ выполнен методом ICP-MS на квадрупольном масс-спектрометре Agilent 7500cx (Agilent Technologies Inc., США) с использованием внутреннего стандарта (In Internal standard, Inorganic Ventures, США) и внешнего стандарта СГД-2А (ГСО 8670-2005).

Рис. 3. Сводный геолого-геофизический разрез скважины Юр-92. Условные обозначения литологической колонки: 1 – песчаник; 2 – алевролит; 3 – породы смешанного терригенно-сульфатно-карбонатного состава; 4 – ангидрит; 5 – карбонатные породы. Условные обозначения структурных типов пород: 1 – аргиллиты; 2 – алевролиты крупно-мелкозернистые; 3 – алевролиты мелко-крупнозернистые; 4 – переслаивание алевролитов и песчаников; 5 – мелкозернистые песчаники; 6 – среднезернистые песчаники; 7 – крупнозернистые песчаники до гравелитов.

Геохронологические (U-Pb) исследования детритовых цирконов выполнены в Лаборатории геохронологии и геодинамики Томского государственного университета методом лазерной абляции (LA-ICP-MS) на квадрупольном масс-спектрометре с индуктивно-связанной плазмой Agilent 7900 и системе лазерной абляции с эксимерным (ArF) лазером Analyte Excite (Teledyne CETAC Technologies, США) (аналитики: А.П. Корнева, Е.А. Агашева, А.С. Семиряков).

Образец, смонтированный в шашку с эпоксидной смолой, помещался в ячейку HeEx II, откуда при абляции анализируемое вещество переносится потоком гелия в масс-спектрометр. Диаметр лазерного пучка составлял 25 мкм. Каждая точка анализировалась в течение 20–30 секунд (в ряде случаев выбран временной промежуток с наилучшим сигналом). Для удаления поверхностных

загрязнений осуществлена преабляция. Время измерения фона между анализом точек составило 20 с. В качестве стандартов использовались международные стандарты цирконов 91500 (Wiedenbeck et al., 1995), FC1 (Paces et al., 1993), Temora II (Black et al., 2004), GJ1 (Jackson et al., 2004), OG1 (Stern et al., 2009). Обработка выполненных измерений проводилась с использованием программного пакета Dezirteer. Произведен фильтр значений по дискордантности. Был выставлен порог для положительных и отрицательных значений несоответствия (+10%, -10%). В интерпретации учитывались только оценки возраста, дискордантность (D) которых не превышает 10%, при этом для цирконов с возрастом <1 млрд лет $D = ((^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U} \text{ возраст}) / (^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U} \text{ возраст}) - 1) \times 100\%$, а для цирконов >1 млрд лет $D = ((^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb} \text{ возраст}) / (^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U} \text{ возраст}) - 1) \times 100\%$ (Powerman et al., 2021).

Петрографическая характеристика

Минеральный состав изученных пород ванаварской свиты в соответствии с классификацией Н.В. Логвиненко отвечает аркозовым песчаникам (рис. 4а).

Структура псаммитовая, размер зерен изменяется от 0.1 до 1.0 мм, преобладают зерна 0.1–0.55 мм. Среди обломков различаются полуокатанные (55–60%), неокатанные (40–45%), единичные окатанные обломки (рис. 5к). Снизу вверх по разрезу степень сортировки изменяется от средней до хорошей. Для песчаников ванаварской свиты характерен смешанный тип цементации. В одних образцах отмечается поровый карбонатный и сульфатный цемент. Карбонатная составляющая цемента представлена доломитом (рис. 5м), а сульфатная – ангидритом, образующим пойкилитовые кристаллы, размером до 2 мм (рис. 5л).

В других образцах зерна кварца соединяются в процессе регенерации с формированием конформных контактов с поровым карбонатным цементом (рис. 4и, к). Средний минеральный состав пород ванаварской свиты: кварц (~60%), полевые шпаты (~27%), слюда (~3%) и обломки пород различного генезиса (~10%). Кварц характеризуется неправильной, удлиненной формой с равномерным и облачным угасанием со следами регенерации в виде каемок толщиной 0,008–0,1 мм. Полевые шпаты слабо или полностью пелитизированы и представлены ортоклазом, микроклином и кислым плагиоклазом. Из слюд присутствуют чешуйки мусковита, гидратированного биотита и хлорита. Обломки пород представлены кварцитами, кремнисто-слюдистыми микросланцами, глинистыми породами, единичными обломками гранитоидов. Акцессорные минералы: циркон, турмалин, лейкоксен, сфен.

Минеральный состав изученных образцов оскобинской свиты в соответствии с классификацией, проведенной по методике Н.В. Логвиненко (Логвиненко, 1974), соответствует аркозам (рис. 4б).

Нижняя пачка оскобинской свиты представлена алевропесчаниками и песчаниками. Структура псаммитовая, алеврит-псаммитовая, размер зерен изменяется от 0.02 до 0.6 мм, преобладают зерна 0.08–0.2 мм. Среди обломков различаются неокатанные (45–50%), полуокатанные (40–45%) и окатанные обломки (5–10%). Степень

сортировки средняя. Для пород характерен смешанный тип цемента. Преобладают поровый карбонатный и сульфатный цементы. Карбонатная составляющая цемента представлена кальцитом (рис. 5з), реже доломитом, а сульфатная – ангидритом, которые образуют пойкилитовые кристаллы размером до 4 мм (рис. 5д-з). Реже встречается бесцементное контактное и регенерационное полевошпатовое и кварцевое соединение зерен с формированием конформных контактов (рис. 5д).

Средний минеральный состав песчаников и алевропесчаников нижней подсвиты оскобинской свиты: кварц (~60%), полевые шпаты (~29%), слюда (~2%) и обломки пород различного генезиса (~9%). Кварц характеризуется неправильной, удлиненной формой с равномерным и облачным угасанием со следами регенерации в виде каемок толщиной 0.008–0.01 мм, иногда зёрна по периферии растворены, отчего приобретают неровные края. Полевые шпаты слабо или полностью пелитизированы, частично растворены и представлены ортоклазом, микроклином и кислым плагиоклазом. Слюды представлены мусковитом и хлоритом. Среди обломков пород диагностируются кварциты, кремнисто-слюдистые микросланцы, глинистые породы. Акцессорные минералы: циркон, турмалин, рутил, сфен и пироксены.

Средняя пачка оскобинской свиты представлена песчанистыми алевролитами, алевритистыми песчаниками. Структура псаммитовая, алевритовая, размер зерен изменяется от 0.05 до 0.15 мм, в алевролитах преобладают зерна размером 0.05–0.12 мм. Среди обломков различаются неокатанные (80–85%) и полуокатанные (15–20%). Степень сортировки средняя для песчаников, для алевролитов хорошая. Для всех изученных пород средней пачки оскобинской свиты характерен смешанный тип цементации. В одних образцах плёночно-поровый глинистый цемент, предположительно каолинит-гидрослюдистого состава (рис. 4б). В порах развивается каолинит плохо или хорошо раскристаллизованный (рис. 4в). По периметру и на контакте зёрен – редкие крустификационные плёнки, где обломочные зерна обрастают листочками гидрослюды, хлорита. Также наблюдается регенерационное кварцевое соединение зерен с формированием

Рис. 4. Классификационные диаграммы для терригенных пород ванаварской (а) и оскобинской (б) свит по Н.В. Логвиненко (Логвиненко, 1974). Свиты: 1 – ванаварская; 2 – оскобинская (нижняя пачка); 3 – оскобинская (средняя пачка).

Рис. 5. Микрофотографии шлифов терригенных пород средней пачки оскобинской свиты (а–г) и нижней пачки оскобинской свиты (д–з) и ванаварской свиты (и–м) (николи скрещены). Обозначения: (а) алевролит песчанистый с поровым карбонатным и регенерационным кварцевым цементом; (б) песчаник мелкозернистый алевролитистый с поровым карбонатным и регенерационным кварцевым цементом; (в) песчаник мелкозернистый с регенерационным кварцевым цементом, в порах развивается каолинит; (г) алевролит песчанистый с регенерационным кварцевым цементом, в единичных порах наблюдается ангидрит; (д) песчаник мелкозернистый алевролитовый с поровым сульфатным цементом; (е) песчаник мелкозернистый алевролитовый с поровым сульфатным цементом; (ж) песчаник мелкозернистый алевролитистый с поровым сульфатным цементом; (з) песчаник мелкозернистый с поровым сульфатным и карбонатным цементом; (и) песчаник разнозернистый с регенерационным кварцевым цементом; (к) песчаник средне-мелкозернистый с регенерационным кварцевым цементом, в единичных порах карбонатный цемент; (л) песчаник мелко-среднезернистый с поровым сульфатным цементом; (м) песчаник средне-мелкозернистый с поровым сульфатным и карбонатным цементом. Длина масштабной линейки на всех фото 1 мм.

конформных контактов с поровым карбонатным цементом (рис. 4б, в, г). В некоторых образцах поровый сульфатный цемент, представленный зернами ангидрита размером 0.15–0.2 мм (рис. 4а, г). Средний минеральный состав терригенных пород верхней подсвиты: кварц (~66%), полевые шпаты (~25%), слюда (~4%) и обломки пород различного генезиса (~5%). Кварц характеризуется неправильной, удлинённой формой с равномерным и обильным угасанием со следами регенерации в виде каемок толщиной 0.008–0.05 мм, иногда зёрна по периферии растворены, с неровными краями. Полевые шпаты слабо или полностью пелитизированные, частично растворены и представлены ортоклазом, микроклином и кислым плагиоклазом. Из слюд присутствуют чешуйки мусковита и гидратированного биотита. Обломки пород представлены кварцитами, кремнисто-слюдистыми микросланцами, глинистыми породами. Акцессорные минералы: циркон, турмалин, рутил, сфен и пироксены.

Петрогенные оксиды

Содержания петрогенных оксидов в проанализированных образцах ванаварской и оскобинской свит приведены в таблице 1.

Содержания основных петрогенных оксидов в песчаниках ванаварской свиты составляют: $\text{SiO}_2 = 73.26\text{--}79.4$, $\text{TiO}_2 = 0.1\text{--}0.29$, $\text{Al}_2\text{O}_3 = 6.07\text{--}11.22$, $\text{Fe}_2\text{O}_3 = 1.45\text{--}2.66$, $\text{K}_2\text{O} = 1.83\text{--}2.77$ мас.% (табл. 1). На классификационной диаграмме Ф. Петтиджона (Pettijohn et al., 1972)

фигуративные точки составов песчаников ванаварской свиты располагаются в поле аркозов (рис. 6).

Концентрации основных петрогенных оксидов в песчаниках нижней пачки оскобинской свиты составляют: $\text{SiO}_2 = 66.89\text{--}72.63$, $\text{TiO}_2 = 0.1\text{--}0.12$, $\text{Al}_2\text{O}_3 = 2.94\text{--}7.36$, $\text{Fe}_2\text{O}_3 = 0.57\text{--}0.75$, $\text{K}_2\text{O} = 0.41\text{--}0.78$ мас.% (табл. 1). На классификационной диаграмме Ф. Петтиджона (Pettijohn et al., 1972) фигуративные точки пород нижней пачки оскобинской свиты располагаются в поле арениитов и суфлитарениитов (рис. 6).

Содержания основных петрогенных оксидов в песчаниках средней пачки оскобинской свиты составляют: $\text{SiO}_2 = 74.16\text{--}77.64$, $\text{TiO}_2 = 0.2\text{--}0.33$, $\text{Al}_2\text{O}_3 = 9.25\text{--}13.19$, $\text{Fe}_2\text{O}_3 = 0.9\text{--}1.46$, $\text{K}_2\text{O} = 4.63\text{--}5.28$ мас.% (табл. 1). На классификационной диаграмме Ф. Петтиджона (Pettijohn et al., 1972) фигуративные точки пород средней пачки оскобинской свиты располагаются в поле аркозов (рис. 6).

Редкоземельные элементы

Концентрации редкоземельных элементов (РЗЭ) в изученных образцах терригенных пород ванаварской и оскобинской свит приведены в таблице 1. Для наглядного представления особенностей распределения этих элементов проведено их нормирование на хондрит (Boynnton, 1984).

Для пород ванаварской свиты обнаруживаются фракционированные спектры распределения РЗЭ ($\text{Lan/Ybn} = 6.0\text{--}15.36$) и обогащение легкими лантаноидами ($\text{Lan/Smn} = 3.48\text{--}5.79$) относительно тяжелых

(Gdn/Ybn = 0.93–1.61). На спектрах распределения РЗЭ для пород ванаварской свиты фиксируется как ярко выраженная положительная европиевая аномалия, так и слабо отрицательная (Eu/Eu* = 0.78–2.63) (рис. 7а).

Породы нижней пачки оскобинской свиты обнаруживают фракционированные спектры распределения РЗЭ (Lan/Ybn = 8.24–10.59) и обогащение легкими лантаноидами (La_n/Sm_n = 2.67–3.71) относительно тяжелых (Gd_n/Yb_n = 1.29–2.18). На спектрах распределения РЗЭ для большей части изученных образцов пород нижней пачки оскобинской свиты фиксируется отрицательная европиевая аномалия (Eu/Eu* = 0.57–0.1). Исключение составил один образец, для которого характерна положительная европиевая аномалия (Eu/Eu* = 1.54) (рис. 7б).

Терригенные породы средней пачки оскобинской свиты обнаруживают менее фракционированные спектры распределения РЗЭ (La_n/Yb_n = 4.39–7.25). Отмечается обогащение легкими лантаноидами (La_n/Sm_n = 3.25–3.84), относительно тяжелых (Gd_n/Yb_n = 1.00–1.18).

Рис. 6. Положение фигуративных точек на диаграммах Ф. Петтиджона (Pettijohn et al., 1972). Свиты: 1 – ванаварская; 2 – оскобинская (нижняя пачка); 3 – оскобинская (средняя пачка).

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
№ обр.	2593-21	2594-21	2596-21	2599-21	2651-21	2652-21	2659-21	2664-21	2789-21	2810-21	2832-21	2851-21	2861-21
Глубина, м	2401.47	2401.65	2402.11	2402.82	2423.46	2423.78	2425.89	2427.36	2457.43	2461.76	2466.74	2471.64	2474.96
Компонент, мас. %	Средняя пачка оскобинской свиты				Нижняя пачка оскобинской свиты				Ванаварская свита				
	SiO ₂	74.2	75.7	77.6	74.3	72.6	66.9	68.2	63.2	79.3	77.7	77.6	79.4
TiO ₂	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3
Al ₂ O ₃	9.9	11.3	9.3	13.2	2.9	5.3	4.0	7.4	8.2	6.1	7.7	11.2	9.9
Fe ₂ O ₃	0.9	0.9	1.3	1.5	0.7	0.7	0.6	0.8	1.5	1.7	1.9	1.9	2.7
MnO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
MgO	2.0	1.7	2.0	1.7	2.9	2.9	3.4	7.9	1.3	1.1	1.5	1.2	2.2
CaO	1.1	0.8	1.1	0.7	4.7	6.4	6.1	6.5	0.9	0.2	0.2	0.7	1.2
Na ₂ O	0.5	0.1	0.4	0.0	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.8	0.6	0.6	0.5
K ₂ O	5.3	5.1	4.6	5.2	0.7	0.8	0.5	0.4	2.8	1.8	2.5	1.9	2.7
P ₂ O ₅	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
п.п.п.	5.0	3.6	2.1	1.9	9.3	8.3	9.1	10.0	4.6	9.8	7.1	1.4	4.7
Сумма	99.3	99.4	98.7	98.8	94.6	92.0	92.4	97.1	99.2	99.4	99.3	98.6	97.4
CIA	53.18	61.49	54.47	65.68	22.73	28.67	24.54	35.91	60.31	62.17	65.88	72.27	62.58
ICV	1.03	0.77	1.05	0.71	3.26	2.13	2.76	2.2	0.86	0.95	0.89	0.57	0.97
ppm													
La	11.9	8.72	11.33	11.71	7.45	8.07	6.86	7.49	11.04	11.08	12.17	7.39	13.76
Ce	19.26	14.13	18.48	21.75	11.9	12.89	11.69	13.06	18.61	17.21	18.98	11.14	26.38
Pr	2.66	1.97	2.57	2.97	1.67	1.86	1.82	1.94	2.66	2.36	2.67	1.53	3.65
Nd	9.35	6.84	9.05	10.82	6.01	6.81	6.9	7.42	9.34	7.92	9.23	5.22	12.55
Sm	1.95	1.47	2.2	2.12	1.26	1.52	1.62	1.76	1.45	1.2	1.41	0.86	2.49
Eu	0.41	0.36	0.56	0.43	0.21	0.25	0.04	0.78	1.03	0.92	0.84	0.24	0.54
Gd	1.57	1.32	2.26	1.59	0.97	1.13	1.18	1.35	1.00	0.97	1.06	0.71	1.78
Tb	0.28	0.23	0.44	0.26	0.16	0.18	0.15	0.22	0.15	0.15	0.18	0.12	0.31
Dy	1.45	1.24	2.45	1.35	0.79	0.86	0.95	1.03	0.75	0.73	0.96	0.61	1.67
Ho	0.33	0.29	0.56	0.3	0.18	0.19	0.23	0.21	0.17	0.16	0.21	0.13	0.39
Er	0.97	0.8	1.54	0.88	0.49	0.53	0.5	0.56	0.47	0.46	0.64	0.36	1.15
Tm	0.12	0.1	0.18	0.1	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.08	0.05	0.15
Yb	1.27	1.03	1.74	1.09	0.61	0.62	0.44	0.57	0.51	0.49	0.76	0.47	1.55
Lu	0.17	0.13	0.22	0.14	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.10	0.06	0.20
Eu/Eu*	0.72	0.79	0.77	0.72	0.57	0.58	0.1	1.54	2.63	2.61	2.1	0.93	0.78
(La/Yb) _n	6.31	5.72	4.39	7.25	8.24	8.72	10.59	8.89	14.58	15.36	10.87	10.67	6
(La/Sm) _n	3.84	3.73	3.25	3.47	3.71	3.34	2.67	2.68	4.79	5.79	5.42	5.43	3.48
(Gd/Yb) _n	1	1.04	1.05	1.18	1.29	1.47	2.18	1.92	1.58	1.61	1.13	1.23	0.93

Табл. 1. Петрохимический состав и содержания редких и редкоземельных элементов в терригенных породах ванаварской и оскобинской свит скважины Юр-92. Примечания: CIA=[Al₂O₃/(Al₂O₃+CaO+Na₂O+K₂O)]×100; ICV=(TiO₂+Fe₂O₃+MnO+MgO+CaO+K₂O+Na₂O)/Al₂O₃; Eu/Eu* = (Eun)/((Smn)*(Gdn)n)/2; (La/Yb)_n, (La/Sm)_n, (Gd/Yb)_n – отношения, нормированные по хондриту (Boynnton, 1984).

На спектрах распределения РЗЭ для этих песчаников фиксируется слабо выраженная отрицательная европиевая аномалия ($Eu/Eu^* = 0.72-0.79$) (рис. 7в).

Результаты исследований детритовых цирконов

Из песчаника ванаварской свиты (проба № 3 NIP13 (скв. Юр-92, глубина 2465–2470 м)) было выделено 100 зерен детритовых цирконов (табл. 2), представленных коротко- и длиннопризматического, дипирамидального и редко бочонковидного облика зернами (рис. 8а). Конкордантные значения были получены для 94 зерен. Возраст самого молодого детритового циркона составил 1775 ± 2 млн лет, самого древнего – 2765 ± 24 млн лет. 18 зерен (19%) соответствуют архейскому, 72 зерен (81%) отвечает раннепротерозойскому возрасту. Архейские оценки возраста отвечают интервалу от 2510 до 3765 млн лет и образуют пик на 2597 млн лет (5 зерен). Наибольшая популяция зерен детритовых цирконов соответствует раннему протерозою – от 1775 до 2420 млн лет с основным пиком на 1889 млн лет (20 зерен) (рис. 9а).

Из песчаника нижней пачки оскобинской свиты (проба № 2 NIP12 (скв. Юр-92, глубина 2427–2424 м)) было выделено 107 зерен детритовых цирконов (табл. 2), представленных преимущественно обломками призматического и дипирамидального облика. Обломки и зерна преимущественно окатанные, реже угловатые (рис. 8б). Конкордантные значения были получены для 100 зерен. Возраст самого молодого детритового циркона составил 765 ± 11 млн лет, самого древнего – 3040 ± 15 млн лет. Архейские оценки возраста получили 32 зерна (32%). Раннепротерозойские оценки возраста получили 53 зерна (53%). Среднему рифею отвечает 6 зерен (6%) и 9 зерен

детритовых цирконов (9%) обнаруживают позденерифейские оценки возраста. Архейские оценки возраста отвечают интервалу от 2515 до 3040 млн лет, и образуют два пика на 2513 и 2689 млн лет (по 7 зерен каждый). Раннепротерозойские оценки возраста составляют от 1665 до 2500 млн лет с основным пиком на 1894 млн лет (12 зерен). Среднерифейские оценки возраста варьируют от 1040 до 1335 млн лет. Позднерифейские оценки возраста охватывают интервал от 765 до 990 млн лет с основными пиками на 821 и 981 млн лет (рис. 9б).

Из песчаника средней пачки оскобинской свиты (проба № 1 NIP11 (скв. Юр-92, глубина 2401–2402 м)) было выделено 123 зерен детритовых цирконов (табл. 2), представленных коротко- и длиннопризматическими, дипирамидальными бочонковидными зернами и их обломками (рис. 8в). Конкордантные значения были получены для 121 зерна. Возраст самого молодого детритового циркона составил 585 ± 16 млн лет, самого древнего – 3525 ± 13 млн лет. Архейские оценки возраста получили 12 зерен (10%). Раннему протерозою отвечает 64 зерна (53%). Раннему рифею отвечает 4 зерна (3%), среднему – 1 зерно (1%), а позднему – 39 зерен (32%). Также отмечается одно значение возраста, соответствующее венду. Архейские оценки возраста отвечают интервалу от 2525 до 3525 млн лет. Раннепротерозойские оценки возраста распределились в интервале от 1695 до 2480 млн лет с основным пиком на 1869 млн лет (13 зерен). Раннерифейские оценки возраста отвечают интервалу от 1555 до 1650 млн лет. Одно значение возраста соответствует среднему рифею (1290 млн лет). Позднему рифею соответствуют значения возраста от 605 до 944 млн лет и образуют пик на 653 млн лет (15 зерен). Венду отвечает один циркон с возрастом 585 млн лет (рис. 9в).

Рис. 7. Спектры распределения РЗЭ, нормированные по хондриту (Boynnton, 1984), для терригенных пород оскобинской и ванаварской свит: (а) – ванаварская свита; (б) – нижняя пачка оскобинской свиты; (в) – средняя пачка оскобинской свиты

Оскобинская свита. Средняя пачка															
№	Th/U	Изотопные отношения						Rho	Возраст, млн. лет						D, %
		207Pb/ 206Pb	1σ abs	207Pb/ 235U	1σ abs	206Pb/ 238U	1σ abs		207Pb/ 206Pb	1σ	206Pb/ 238U	1σ	207Pb/ 235U	1σ	
N1-1	0.46	0.1143	0.0031	5.3716	0.0051	0.3410	0.0040	0.790	1865	24	1891	13	1880	2	0
N1-2	0.37	0.0655	0.0025	1.1446	0.0044	0.1268	0.0037	0.826	785	40	769	11	774	2	0
N1-3	0.47	0.0675	0.0034	1.2605	0.0052	0.1355	0.0039	0.751	850	52	819	12	828	2	1
N1-4	0.59	0.1200	0.0038	4.8622	0.0059	0.2940	0.0045	0.767	1955	28	1661	14	1795	3	8
N1-5	1.02	0.1170	0.0036	5.4663	0.0052	0.3390	0.0038	0.731	1910	27	1881	12	1895	2	0
N1-6	0.52	0.0639	0.0043	0.9000	0.0058	0.1022	0.0039	0.666	735	72	627	12	651	2	3
N1-7	0.23	0.1122	0.0032	5.3657	0.0053	0.3470	0.0042	0.799	1830	25	1920	13	1879	2	-2
N1-8	0.54	0.0647	0.0034	1.1057	0.0054	0.1240	0.0042	0.779	760	55	753	13	756	2	0
N1-9	1.50	0.1017	0.0037	3.2349	0.0057	0.2308	0.0044	0.766	1650	33	1338	14	1465	2	9
N1-10	0.95	0.0965	0.0044	3.2318	0.0066	0.2430	0.0049	0.750	1555	42	1402	15	1464	3	4
N1-11	0.28	0.1256	0.0033	6.5258	0.0056	0.3770	0.0045	0.800	2035	23	2062	14	2049	2	0
N1-12	0.15	0.1196	0.0033	6.0163	0.0054	0.3650	0.0043	0.799	1945	24	2005	13	1978	2	-1
N1-13	1.50	0.1101	0.0032	4.3078	0.0050	0.2839	0.0038	0.772	1800	26	1610	12	1694	2	5
N1-14	0.58	0.0647	0.0046	1.0397	0.0065	0.1166	0.0046	0.706	760	74	710	14	723	3	1
N1-15	1.39	0.1110	0.0041	4.4517	0.0064	0.2910	0.0049	0.768	1815	33	1646	15	1722	3	4
N1-16	1.10	0.1050	0.0036	3.8493	0.0058	0.2660	0.0046	0.789	1710	31	1520	14	1603	2	5
N1-17	0.95	0.0623	0.0038	0.8509	0.0053	0.0991	0.0036	0.688	680	65	609	11	625	2	2
N1-18	1.07	0.0695	0.0037	1.4540	0.0057	0.1518	0.0043	0.756	910	55	911	13	911	2	0
N1-19	0.77	0.0616	0.0031	0.8736	0.0048	0.1029	0.0037	0.767	655	53	631	11	637	2	0
N1-20	0.98	0.0686	0.0034	1.2574	0.0054	0.1330	0.0043	0.785	885	50	804	13	826	2	2
N1-21	0.94	0.1160	0.0032	5.2917	0.0050	0.3310	0.0039	0.773	1890	24	1843	12	1867	2	1
N1-22	0.17	0.1182	0.0028	5.5712	0.0051	0.3420	0.0043	0.837	1925	21	1896	13	1911	2	0
N1-23	0.79	0.1108	0.0034	4.9323	0.0056	0.3230	0.0045	0.798	1810	27	1804	14	1807	2	0
N1-24	0.46	0.0646	0.0038	0.9651	0.0056	0.1084	0.0040	0.724	760	62	663	13	685	2	3
N1-25	1.98	0.1081	0.0026	3.9733	0.0042	0.2667	0.0032	0.779	1765	22	1524	10	1628	2	6
N1-26	0.52	0.0650	0.0027	1.1843	0.0049	0.1322	0.0041	0.838	770	43	800	13	793	2	0
N1-27	1.11	0.1095	0.0033	4.7688	0.0054	0.3160	0.0043	0.796	1790	27	1770	13	1779	2	0
N1-28	0.71	0.0624	0.0040	0.9116	0.0057	0.1060	0.0041	0.718	685	68	649	13	657	2	1
N1-29	0.74	0.1210	0.0034	5.8699	0.0054	0.3520	0.0042	0.780	1970	24	1944	13	1956	2	0
N1-30	0.24	0.1238	0.0025	6.3470	0.0043	0.3720	0.0036	0.822	2010	17	2038	11	2024	2	0
N1-31	0.62	0.0712	0.0037	1.1186	0.0053	0.1140	0.0039	0.729	960	52	695	12	762	2	9
N1-32	0.44	0.1539	0.0032	9.2476	0.0050	0.4360	0.0038	0.762	2385	17	2332	12	2362	2	1
N1-33	0.62	0.1668	0.0030	10.8044	0.0050	0.4700	0.0039	0.792	2525	15	2483	12	2506	2	0
N1-34	0.46	0.1253	0.0031	6.4066	0.0049	0.3710	0.0038	0.773	2030	22	2034	12	2033	2	0
N1-35	0.68	0.1207	0.0026	6.0716	0.0045	0.3650	0.0036	0.812	1965	19	2005	11	1986	2	0
N1-36	1.14	0.1042	0.0035	4.0641	0.0059	0.2830	0.0047	0.801	1695	31	1606	15	1647	2	2
N1-37	0.81	0.0618	0.0040	0.9420	0.0059	0.1106	0.0044	0.737	665	69	676	14	673	3	0
N1-38	0.11	0.1147	0.0026	5.5169	0.0049	0.3490	0.0042	0.856	1870	20	1929	13	1903	2	-1
N1-39	0.66	0.0637	0.0037	0.9077	0.0056	0.1034	0.0042	0.745	730	62	634	13	655	2	3
N1-40	0.39	0.1155	0.0035	5.5713	0.0053	0.3500	0.0040	0.748	1885	27	1934	12	1911	2	-1
N1-41	0.75	0.0646	0.0057	0.9348	0.0072	0.1050	0.0044	0.613	760	92	643	14	670	3	4
N1-42	0.50	0.1167	0.0029	5.5648	0.0050	0.3460	0.0040	0.808	1905	22	1915	12	1910	2	0

Табл. 2. Результаты LA-ICP-MS U-Pb исследования детритовых цирконов из песчаников ванаварской и оскобинской свит скважины Юр-92

№	Th/U	Изотопные отношения						Rho	Возраст, млн. лет						D, %
		207Pb/ 206Pb	1σabs	207Pb/ 235U	1σabs	206Pb/ 238U	1σabs		207Pb/ 206Pb	1σ	206Pb/ 238U	1σ	207Pb/ 235U	1σ	
N1-43	0.61	0.2276	0.0034	18.4127	0.0051	0.5870	0.0038	0.746	3030	12	2977	12	3011	2	1
N1-44	0.62	0.0647	0.0043	1.0352	0.0062	0.1161	0.0044	0.719	760	70	708	14	721	3	1
N1-45	0.80	0.0641	0.0036	1.0884	0.0055	0.1232	0.0042	0.764	740	59	748	13	747	2	0
N1-46	0.59	0.0619	0.0040	0.8693	0.0056	0.1019	0.0040	0.704	665	69	625	12	635	2	1
N1-47	0.92	0.1678	0.0031	11.1004	0.0050	0.4800	0.0039	0.778	2535	15	2527	12	2531	2	0
N1-48	0.57	0.1157	0.0032	5.2461	0.0050	0.3290	0.0039	0.774	1885	24	1833	12	1860	2	1
N1-49	0.33	0.1105	0.0037	4.7819	0.0059	0.3140	0.0046	0.782	1805	30	1760	14	1781	2	1
N1-50	0.30	0.1150	0.0027	5.2936	0.0047	0.3340	0.0039	0.818	1875	21	1857	12	1867	2	0
N1-51	0.54	0.1084	0.0035	4.8852	0.0056	0.3270	0.0045	0.789	1770	29	1823	14	1799	2	-1
N1-52	0.72	0.1255	0.0033	6.8147	0.0054	0.3940	0.0043	0.790	2035	23	2141	13	2087	2	-2
N1-53	0.62	0.1057	0.0035	3.6637	0.0055	0.2515	0.0042	0.767	1725	30	1446	13	1563	2	8
N1-54	0.84	0.1147	0.0028	5.1691	0.0050	0.3270	0.0042	0.831	1870	22	1823	13	1847	2	1
N1-55	0.67	0.1628	0.0031	10.6350	0.0050	0.4740	0.0039	0.783	2480	16	2501	12	2491	2	0
N1-56	0.27	0.0628	0.0027	1.1476	0.0047	0.1326	0.0038	0.812	700	46	802	12	776	2	-3
N1-57	0.79	0.1750	0.0031	11.6973	0.0052	0.4850	0.0042	0.807	2605	14	2549	13	2580	2	1
N1-58	1.37	0.0643	0.0046	0.8826	0.0061	0.0996	0.0040	0.658	750	75	612	13	642	3	4
N1-59	0.42	0.1913	0.0047	14.6587	0.0071	0.5560	0.0053	0.748	2750	20	2850	17	2793	3	-1
N1-60	0.11	0.1188	0.0039	5.2884	0.0057	0.3230	0.0041	0.727	1935	29	1804	13	1866	2	3
N1-61	0.92	0.1206	0.0043	5.5347	0.0063	0.3330	0.0046	0.728	1960	32	1852	14	1906	3	2
N1-62	0.77	0.1221	0.0051	5.8897	0.0073	0.3500	0.0052	0.717	1985	37	1934	16	1959	3	1
N1-63	1.15	0.0616	0.0058	0.9423	0.0079	0.1110	0.0054	0.684	655	100	678	17	674	4	0
N1-64	0.41	0.1591	0.0052	10.6564	0.0083	0.4860	0.0065	0.780	2445	27	2553	20	2493	4	-2
N1-65	0.41	0.1177	0.0049	5.4828	0.0075	0.3380	0.0057	0.761	1920	37	1877	18	1897	3	1
N1-66	0.66	0.1772	0.0055	12.4060	0.0084	0.5080	0.0064	0.760	2625	25	2648	20	2635	4	0
N1-67	0.90	0.1121	0.0057	5.1138	0.0079	0.3310	0.0055	0.696	1830	46	1843	17	1838	4	0
N1-68	0.69	0.1195	0.0047	5.4843	0.0075	0.3330	0.0058	0.776	1945	35	1852	18	1898	3	2
N1-69	0.16	0.1380	0.0045	7.6266	0.0068	0.4010	0.0051	0.752	2200	28	2173	16	2187	3	0
N1-70	0.38	0.1249	0.0042	7.2297	0.0068	0.4200	0.0053	0.785	2025	29	2260	17	2140	3	-5
N1-71	0.65	0.0702	0.0059	1.2897	0.0078	0.1333	0.0051	0.654	930	86	806	16	841	3	4
N1-72	0.82	0.0622	0.0046	0.8881	0.0065	0.1036	0.0046	0.710	680	79	635	14	645	3	1
N1-73	2.24	0.1043	0.0053	4.7148	0.0073	0.3280	0.0050	0.687	1700	46	1828	16	1769	3	-3
N1-74	0.58	0.1580	0.0049	10.3868	0.0074	0.4770	0.0055	0.752	2430	26	2514	17	2469	3	-1
N1-76	0.85	0.0623	0.0049	0.9033	0.0064	0.1052	0.0041	0.642	680	84	644	13	653	3	1
N1-77	0.55	0.1067	0.0051	4.6174	0.0075	0.3140	0.0055	0.736	1740	43	1760	17	1752	3	0
N1-78	0.84	0.1744	0.0047	11.9456	0.0072	0.4970	0.0055	0.762	2595	22	2600	17	2600	3	0
N1-79	0.61	0.0667	0.0074	0.9799	0.0090	0.1066	0.0052	0.571	825	116	652	16	693	4	6
N1-80	0.44	0.0840	0.0047	2.3281	0.0069	0.2011	0.0050	0.727	1290	55	1181	16	1220	3	3
N1-81	0.72	0.1174	0.0050	5.5335	0.0076	0.3420	0.0056	0.746	1915	38	1896	18	1905	3	0
N1-82	1.03	0.1150	0.0047	5.2777	0.0079	0.3330	0.0064	0.804	1875	37	1852	20	1865	4	0
N1-83	0.05	0.1124	0.0049	5.1894	0.0069	0.3350	0.0049	0.705	1835	39	1862	15	1850	3	0
N1-84	1.02	0.0639	0.0051	0.8674	0.0074	0.0985	0.0054	0.725	735	84	605	17	634	3	4
N1-85	0.65	0.1271	0.0050	6.1659	0.0072	0.3520	0.0052	0.723	2055	34	1944	16	1999	3	2
N1-86	0.15	0.0685	0.0052	1.4897	0.0074	0.1578	0.0052	0.709	880	78	944	16	926	3	-1
N1-87	2.07	0.1175	0.0048	4.9876	0.0074	0.3080	0.0056	0.761	1915	36	1730	18	1817	3	4
N1-88	0.78	0.0697	0.0101	1.0672	0.0125	0.1111	0.0074	0.589	915	149	679	23	737	6	8

Табл. 2. Результаты LA-ICP-MS U-Pb исследования детритовых цирконов из песчаников ванаварской и оскобинской свит скважины Юр-92

№	Th/U	Изотопные отношения						Rho	Возраст, млн. лет						D, %
		207Pb/ 206Pb	1σ abs	207Pb/ 235U	1σ abs	206Pb/ 238U	1σ abs		207Pb/ 206Pb	1σ	206Pb/ 238U	1σ	207Pb/ 235U	1σ	
N1-89	0.05	0.0612	0.0044	0.9210	0.0063	0.1092	0.0046	0.725	645	76	668	14	662	3	0
N1-90	0.05	0.1149	0.0045	4.9564	0.0066	0.3130	0.0049	0.739	1875	35	1755	15	1811	3	3
N1-91	0.31	0.0640	0.0111	0.9641	0.0129	0.1093	0.0066	0.508	740	109	668	21	685	6	2
N1-92	0.44	0.2100	0.0058	15.2813	0.0083	0.5280	0.0060	0.716	2900	22	2733	19	2832	4	3
N1-93	0.63	0.1169	0.0049	5.1394	0.0071	0.3190	0.0051	0.723	1905	37	1784	16	1842	3	3
N1-94	0.94	0.0629	0.0096	0.8833	0.0114	0.1019	0.0061	0.535	700	162	625	19	642	5	2
N1-95	0.60	0.1177	0.0058	5.6125	0.0084	0.3460	0.0062	0.729	1920	44	1915	19	1918	4	0
N1-96	1.32	0.0641	0.0066	0.9311	0.0086	0.1054	0.0054	0.632	740	109	645	17	668	4	3
N1-97	0.57	0.0687	0.0098	1.0737	0.0116	0.1134	0.0063	0.538	885	147	692	20	740	5	6
N1-98	1.00	0.3110	0.0056	31.2460	0.0080	0.7290	0.0057	0.717	3525	13	3529	18	3526	4	0
N1-99	0.50	0.0997	0.0058	3.6550	0.0084	0.2660	0.0061	0.724	1615	54	1520	19	1561	4	2
N1-100	0.63	0.1343	0.0066	7.6812	0.0090	0.4150	0.0061	0.682	2150	42	2237	19	2194	4	-1
N1-101	0.37	0.1261	0.0062	6.7082	0.0085	0.3860	0.0058	0.683	2040	43	2104	18	2073	4	-1
N1-102	0.56	0.1234	0.0047	6.2585	0.0075	0.3680	0.0058	0.775	2005	34	2019	18	2012	3	0
N1-103	1.25	0.1085	0.0051	4.5308	0.0076	0.3030	0.0057	0.747	1770	42	1706	18	1736	3	1
N1-105	0.63	0.1404	0.0053	7.9140	0.0076	0.4090	0.0055	0.719	2230	32	2210	17	2221	3	0
N1-106	0.44	0.1183	0.0051	5.6411	0.0078	0.3460	0.0059	0.756	1925	38	1915	18	1922	3	0
N1-107	0.11	0.1217	0.0048	6.1890	0.0069	0.3690	0.0050	0.721	1980	35	2024	16	2002	3	-1
N1-108	0.19	0.1135	0.0043	6.0849	0.0066	0.3890	0.0050	0.754	1855	34	2118	16	1988	3	-6
N1-109	0.53	0.0623	0.0052	1.1213	0.0078	0.1306	0.0058	0.740	680	89	791	18	763	3	-3
N1-110	0.38	0.0640	0.0062	0.8388	0.0081	0.0951	0.0052	0.648	740	102	585	16	618	4	5
N1-111	0.99	0.0624	0.0073	0.8944	0.0094	0.1040	0.0060	0.633	685	124	637	19	648	4	1
N1-112	0.56	0.1089	0.0050	5.0878	0.0073	0.3390	0.0054	0.736	1780	41	1881	17	1834	3	-2
N1-113	1.08	0.1823	0.0053	12.1601	0.0076	0.4840	0.0055	0.721	2670	23	2544	17	2616	3	2
N1-114	0.89	0.1974	0.0050	12.4056	0.0077	0.4560	0.0058	0.756	2800	20	2421	18	2635	3	8
N1-115	0.68	0.1118	0.0056	5.0076	0.0082	0.3250	0.0059	0.725	1825	45	1814	19	1820	4	0
N1-116	2.40	0.0606	0.0063	0.8536	0.0084	0.1022	0.0055	0.653	620	113	627	17	626	4	0
N1-117	0.85	0.0662	0.0063	1.1359	0.0086	0.1245	0.0059	0.688	810	99	756	19	770	4	1
N1-118	0.21	0.1393	0.0058	8.1400	0.0083	0.4240	0.0060	0.720	2215	35	2278	19	2246	4	-1
N1-119	0.50	0.0639	0.0094	1.2144	0.0109	0.1379	0.0055	0.500	735	156	832	17	807	5	-3
N1-120	0.52	0.1061	0.0047	4.3721	0.0067	0.2990	0.0048	0.712	1730	40	1686	15	1707	3	1
N1-121	0.13	0.1105	0.0046	5.1474	0.0067	0.3380	0.0048	0.722	1805	38	1877	15	1843	3	-1
N1-122	0.33	0.1724	0.0041	10.3355	0.0064	0.4350	0.0049	0.771	2580	19	2328	15	2465	3	5
N1-123	0.16	0.0987	0.0053	3.3871	0.0097	0.2490	0.0081	0.838	1595	49	1433	26	1501	4	4
Оскобинская свита. Нижняя пачка															
N2-1	1.166	0.1647	0.0031	10.5549	0.0054	0.4650	0.0044	0.8114	2500	16	2461	14	2484	2	0
N2-2	0.882	0.1223	0.0037	6.5061	0.0057	0.3860	0.0044	0.7671	1985	26	2104	14	2046	2	-2
N2-3	0.794	0.1661	0.0044	11.8121	0.0067	0.5160	0.0051	0.7512	2515	22	2682	16	2589	3	-3
N2-4	0.585	0.0725	0.0041	1.7416	0.0062	0.1743	0.0046	0.7476	995	57	1035	14	1024	3	-1
N2-5	1.03	0.1935	0.0036	14.4539	0.0057	0.5420	0.0044	0.7708	2770	15	2791	14	2779	2	0
N2-6	0.725	0.0714	0.0031	1.6335	0.0050	0.1660	0.0039	0.7798	965	44	990	12	983	2	0
N2-7	1.203	0.1163	0.0038	5.3534	0.0056	0.3340	0.0041	0.7317	1895	29	1857	13	1877	2	1
N2-8	0.654	0.1683	0.0034	10.2289	0.0052	0.4410	0.0039	0.7559	2540	17	2355	12	2455	2	4
N2-9	0.409	0.1698	0.0040	11.3263	0.0058	0.4840	0.0042	0.7297	2550	19	2544	13	2550	2	0
N2-10	0.648	0.1760	0.0040	12.6616	0.0060	0.5220	0.0045	0.7476	2610	18	2707	14	2654	3	-1

Табл. 2. Результаты LA-ICP-MS U-Pb исследования детритовых цирконов из песчаников ванаварской и оскобинской свит скважины Юр-92

№	Th/U	Изотопные отношения						Rho	Возраст, млн. лет						D, %
		207Pb/ 206Pb	1σ abs	207Pb/ 235U	1σ abs	206Pb/ 238U	1σ abs		207Pb/ 206Pb	1σ	206Pb/ 238U	1σ	207Pb/ 235U	1σ	
N2-11	0.604	0.1727	0.0029	11.8054	0.0046	0.4960	0.0036	0.7810	2580	14	2596	11	2589	2	0
N2-12	0.597	0.1282	0.0034	7.1026	0.0052	0.4020	0.0040	0.7678	2070	23	2178	12	2124	2	-2
N2-13	1.206	0.1675	0.0032	12.0501	0.0057	0.5220	0.0047	0.8242	2530	16	2707	15	2608	2	-3
N2-14	0.601	0.0695	0.0039	1.5574	0.0060	0.1626	0.0045	0.7598	910	57	971	14	953	3	-1
N2-15	0.542	0.1240	0.0035	6.6478	0.0054	0.3890	0.0041	0.7661	2010	24	2118	13	2065	2	-2
N2-16	0.352	0.0715	0.0035	1.6289	0.0059	0.1653	0.0048	0.8074	970	49	986	15	981	3	0
N2-17	0.777	0.1155	0.0029	5.3166	0.0050	0.3340	0.0041	0.8206	1885	22	1857	13	1871	2	0
N2-18	0.609	0.1890	0.0038	13.7531	0.0058	0.5280	0.0043	0.7449	2730	16	2733	13	2732	2	0
N2-19	0.72	0.1312	0.0036	6.9795	0.0056	0.3860	0.0044	0.7742	2110	23	2104	14	2108	2	0
N2-20	1.096	0.2010	0.0031	15.3743	0.0050	0.5550	0.0040	0.7922	2830	12	2845	12	2838	2	0
N2-21	0.708	0.1185	0.0038	5.6343	0.0056	0.3450	0.0040	0.7220	1930	29	1910	12	1921	2	0
N2-22	0.726	0.1680	0.0029	11.2063	0.0050	0.4840	0.0040	0.8164	2535	14	2544	13	2540	2	0
N2-23	0.654	0.0726	0.0037	1.2617	0.0052	0.1261	0.0037	0.7037	1000	52	765	11	828	2	8
N2-24	0.976	0.1685	0.0029	11.8898	0.0047	0.5120	0.0037	0.7871	2540	14	2665	11	2595	2	-2
N2-25	1.385	0.1736	0.0029	12.6804	0.0050	0.5300	0.0041	0.8130	2590	14	2741	13	2656	2	-3
N2-26	0.629	0.1024	0.0034	4.3467	0.0055	0.3080	0.0044	0.7921	1665	30	1730	14	1702	2	-1
N2-27	0.989	0.1179	0.0030	5.1021	0.0050	0.3140	0.0040	0.8051	1920	22	1760	13	1836	2	4
N2-28	1.064	0.1296	0.0036	6.9659	0.0060	0.3900	0.0048	0.7987	2090	24	2122	15	2107	3	0
N2-29	0.773	0.1168	0.0032	5.7145	0.0051	0.3550	0.0039	0.7714	1905	24	1958	12	1933	2	-1
N2-30	0.495	0.1277	0.0040	7.0221	0.0056	0.3990	0.0038	0.6872	2065	27	2164	12	2114	2	-2
N2-31	1.321	0.0700	0.0029	1.3265	0.0047	0.1375	0.0037	0.7838	925	42	830	11	857	2	3
N2-32	1.377	0.1183	0.0037	5.6411	0.0058	0.3460	0.0045	0.7743	1925	28	1915	14	1922	2	0
N2-33	0.588	0.1661	0.0035	11.9036	0.0056	0.5200	0.0043	0.7766	2515	17	2699	13	2596	2	-3
N2-34	0.83	0.1187	0.0030	4.6345	0.0050	0.2833	0.0040	0.7964	1935	22	1607	12	1755	2	9
N2-35	0.697	0.1164	0.0031	5.2137	0.0050	0.3250	0.0039	0.7865	1900	23	1814	12	1854	2	2
N2-36	1.157	0.1274	0.0037	6.1629	0.0056	0.3510	0.0042	0.7470	2060	25	1939	13	1999	2	3
N2-37	0.937	0.1238	0.0038	5.5451	0.0055	0.3250	0.0039	0.7147	2010	27	1814	12	1907	2	5
N2-38	0.852	0.1668	0.0030	10.2297	0.0051	0.4450	0.0041	0.8090	2525	15	2372	13	2455	2	3
N2-39	0.407	0.1700	0.0026	11.0351	0.0046	0.4710	0.0038	0.8214	2555	12	2487	12	2526	2	1
N2-40	0.895	0.1716	0.0028	11.5173	0.0046	0.4870	0.0037	0.8002	2570	13	2557	11	2565	2	0
N2-41	0.359	0.1830	0.0028	13.1904	0.0046	0.5230	0.0037	0.7931	2675	12	2711	11	2693	2	0
N2-42	0.998	0.1240	0.0034	6.7503	0.0056	0.3950	0.0045	0.8009	2010	24	2145	14	2079	2	-3
N2-43	1.17	0.1612	0.0027	9.3530	0.0047	0.4210	0.0039	0.8176	2465	14	2265	12	2373	2	4
N2-44	0.996	0.1246	0.0031	6.5082	0.0054	0.3790	0.0044	0.8167	2020	22	2071	14	2047	2	-1
N2-45	0.541	0.0854	0.0039	2.5517	0.0057	0.2168	0.0042	0.7312	1320	44	1264	13	1286	2	1
N2-46	0.363	0.1249	0.0036	5.7321	0.0055	0.3330	0.0041	0.7545	2025	25	1852	13	1936	2	4
N2-47	0.488	0.1168	0.0031	5.7950	0.0048	0.3600	0.0037	0.7646	1905	23	1982	11	1945	2	-1
N2-48	0.561	0.1715	0.0029	11.7706	0.0048	0.4980	0.0038	0.7920	2570	14	2605	12	2586	2	0
N2-49	0.756	0.0747	0.0040	1.6132	0.0055	0.1567	0.0038	0.6898	1055	54	938	12	975	2	3
N2-50	1.053	0.1170	0.0041	4.8535	0.0065	0.3010	0.0051	0.7742	1910	31	1696	16	1794	3	5
N2-51	0.486	0.1721	0.0030	11.4560	0.0049	0.4830	0.0039	0.7886	2575	14	2540	12	2561	2	0
N2-52	0.506	0.1179	0.0027	5.8983	0.0047	0.3630	0.0039	0.8241	1920	20	1996	12	1960	2	-1
N2-53	1.252	0.1149	0.0063	4.8931	0.0091	0.3090	0.0065	0.7182	1875	49	1735	21	1801	4	3
N2-55	2.273	0.1508	0.0051	9.7472	0.0082	0.4690	0.0065	0.7871	2350	28	2479	20	2411	4	-2
N2-56	0.814	0.1152	0.0042	5.0646	0.0071	0.3190	0.0057	0.8065	1880	32	1784	18	1830	3	2

Табл. 2. Результаты LA-ICP-MS U-Pb исследования детритовых цирконов из песчаников ванаварской и оскобинской свит скважины Юр-92

№	Th/U	Изотопные отношения						Rho	Возраст, млн. лет						D, %
		207Pb/ 206Pb	1σ abs	207Pb/ 235U	1σ abs	206Pb/ 238U	1σ abs		207Pb/ 206Pb	1σ	206Pb/ 238U	1σ	207Pb/ 235U	1σ	
N2-57	0.805	0.1689	0.0041	10.8706	0.0062	0.4670	0.0046	0.7431	2545	20	2470	14	2512	3	1
N2-58	2.016	0.0666	0.0043	1.2593	0.0066	0.1372	0.0050	0.7556	820	67	828	16	827	3	0
N2-59	0.979	0.0711	0.0061	1.4257	0.0088	0.1455	0.0063	0.7186	955	88	875	20	899	4	2
N2-60	0.939	0.1105	0.0051	5.1321	0.0072	0.3370	0.0051	0.7116	1805	41	1872	16	1841	3	-1
N2-61	1.546	0.1843	0.0047	13.0301	0.0069	0.5130	0.0050	0.7255	2690	21	2669	16	2681	3	0
N2-62	0.782	0.2286	0.0044	18.0840	0.0067	0.5740	0.0052	0.7633	3040	15	2924	16	2994	3	2
N2-63	1.416	0.1298	0.0050	5.9212	0.0070	0.3310	0.0049	0.7057	2090	33	1843	15	1964	3	6
N2-64	0.978	0.0740	0.0054	1.7756	0.0074	0.1741	0.0052	0.6927	1040	73	1034	16	1036	3	0
N2-65	0.841	0.1830	0.0048	13.7201	0.0076	0.5440	0.0060	0.7823	2675	21	2800	19	2730	3	-2
N2-66	2.174	0.1140	0.0055	5.3732	0.0077	0.3420	0.0054	0.6958	1860	43	1896	17	1880	3	0
N2-67	1.041	0.1632	0.0044	10.8411	0.0069	0.4820	0.0053	0.7681	2485	22	2535	17	2509	3	-1
N2-68	0.578	0.0672	0.0041	1.3725	0.0063	0.1482	0.0048	0.7546	840	64	890	15	877	3	-1
N2-69	1.675	0.1078	0.0049	4.2193	0.0070	0.2840	0.0050	0.7144	1760	41	1611	16	1677	3	4
N2-70	0.876	0.1094	0.0055	5.0810	0.0077	0.3370	0.0054	0.7038	1785	45	1872	17	1832	3	-2
N2-71	0.865	0.1171	0.0042	5.7130	0.0065	0.3540	0.0049	0.7581	1910	32	1953	15	1933	3	-1
N2-72	0.861	0.1099	0.0040	5.5738	0.0064	0.3680	0.0050	0.7775	1795	33	2019	16	1912	3	-5
N2-74	1.29	0.1135	0.0043	5.2089	0.0068	0.3330	0.0052	0.7675	1855	34	1852	16	1854	3	0
N2-75	0.885	0.1216	0.0047	6.2342	0.0072	0.3720	0.0055	0.7575	1975	34	2038	17	2009	3	-1
N2-76	1.038	0.1214	0.0054	6.7594	0.0083	0.4040	0.0063	0.7548	1975	39	2187	20	2080	4	-4
N2-77	0.405	0.1149	0.0049	5.3207	0.0075	0.3360	0.0057	0.7614	1875	38	1867	18	1872	3	0
N2-78	0.753	0.1752	0.0047	12.8455	0.0070	0.5320	0.0052	0.7380	2605	22	2749	16	2668	3	-2
N2-79	0.376	0.1777	0.0039	14.1064	0.0062	0.5760	0.0048	0.7756	2630	18	2932	15	2756	3	-5
N2-80	0.549	0.1220	0.0049	6.2715	0.0081	0.3730	0.0065	0.8015	1980	35	2043	20	2014	4	-1
N2-81	0.404	0.1645	0.0047	11.5849	0.0070	0.5110	0.0052	0.7432	2500	23	2660	16	2571	3	-3
N2-82	0.424	0.1269	0.0050	6.7333	0.0067	0.3850	0.0045	0.6722	2050	34	2099	14	2077	3	-1
N2-83	0.625	0.1246	0.0055	6.2163	0.0075	0.3620	0.0051	0.6800	2020	38	1991	16	2006	3	0
N2-84	0.555	0.1152	0.0050	5.6680	0.0070	0.3570	0.0049	0.7001	1880	38	1967	15	1926	3	-2
N2-85	0.513	0.1671	0.0052	11.5377	0.0074	0.5010	0.0053	0.7139	2525	26	2618	17	2567	3	-1
N2-86	0.541	0.1155	0.0049	5.6031	0.0071	0.3520	0.0052	0.7309	1885	37	1944	16	1916	3	-1
N2-87	0.431	0.0861	0.0053	3.0971	0.0076	0.2610	0.0055	0.7159	1335	59	1494	17	1431	3	-4
N2-88	1.002	0.1748	0.0055	10.9853	0.0080	0.4560	0.0058	0.7269	2600	26	2421	18	2521	4	4
N2-89	1.364	0.1113	0.0052	5.2460	0.0071	0.3420	0.0048	0.6758	1815	42	1896	15	1860	3	-1
N2-90	0.538	0.1059	0.0050	4.9915	0.0071	0.3420	0.0051	0.7113	1725	43	1896	16	1817	3	-4
N2-91	0.771	0.1026	0.0053	4.9208	0.0076	0.3480	0.0056	0.7257	1670	47	1925	17	1805	3	-6
N2-93	0.984	0.1127	0.0050	5.6381	0.0071	0.3630	0.0051	0.7125	1840	40	1996	16	1921	3	-3
N2-94	1.511	0.0815	0.0051	2.5272	0.0072	0.2250	0.0050	0.6973	1230	61	1308	16	1279	3	-2
N2-95	0.372	0.2250	0.0054	15.7836	0.0081	0.5090	0.0060	0.7405	3015	19	2652	19	2863	4	7
N2-96	1.88	0.1768	0.0049	11.4034	0.0071	0.4680	0.0052	0.7325	2620	22	2474	16	2556	3	3
N2-97	0.801	0.1169	0.0047	4.6399	0.0071	0.2880	0.0053	0.7466	1905	36	1631	17	1756	3	7
N2-99	0.81	0.1694	0.0047	11.0428	0.0068	0.4730	0.0050	0.7295	2550	23	2496	16	2526	3	1
N2-100	0.732	0.1265	0.0050	6.6249	0.0073	0.3800	0.0054	0.7309	2045	35	2076	17	2062	3	0
N2-101	0.781	0.1760	0.0058	11.4731	0.0089	0.4730	0.0068	0.7644	2610	27	2496	22	2562	4	2
N2-105	0.34	0.1176	0.0048	5.5429	0.0074	0.3420	0.0056	0.7630	1915	36	1896	18	1907	3	0
N2-106	0.653	0.0743	0.0048	1.4295	0.0071	0.1396	0.0053	0.7372	1045	65	842	16	901	3	6
N2-107	1.621	0.1970	0.0072	14.0095	0.0112	0.5160	0.0086	0.7673	2800	29	2682	27	2750	5	2

Табл. 2. Результаты LA-ICP-MS U-Pb исследования детритовых цирконов из песчаников ванаварской и оскобинской свит скважины Юр-92

№	Th/U	Изотопные отношения						Rho	Возраст, млн. лет						D, %
		207Pb/ 206Pb	1σ abs	207Pb/ 235U	1σ abs	206Pb/ 238U	1σ abs		207Pb/ 206Pb	1σ	206Pb/ 238U	1σ	207Pb/ 235U	1σ	
Ванаварская свита															
N3-1	1.046	0.1200	0.0038	5.7387	0.0059	0.3470	0.0045	0.7642	1955	28	1920	14	1937	2	0
N3-2	0.508	0.1247	0.0031	6.2213	0.0051	0.3620	0.0041	0.8026	2020	21	1991	13	2007	2	0
N3-3	0.711	0.1131	0.0033	5.3932	0.0056	0.3460	0.0045	0.8113	1845	26	1915	14	1883	2	-1
N3-4	0.792	0.1124	0.0033	5.3598	0.0052	0.3460	0.0040	0.7744	1835	26	1915	12	1878	2	-1
N3-5	0.845	0.1165	0.0033	5.3466	0.0057	0.3330	0.0047	0.8134	1900	25	1852	15	1876	2	1
N3-6	1.379	0.1135	0.0032	5.2871	0.0052	0.3380	0.0041	0.7826	1855	25	1877	13	1866	2	0
N3-7	0.664	0.1198	0.0033	5.8448	0.0052	0.3540	0.0039	0.7638	1950	24	1953	12	1953	2	0
N3-8	0.263	0.1131	0.0031	5.4088	0.0050	0.3470	0.0040	0.7915	1845	24	1920	12	1886	2	-1
N3-9	0.504	0.1220	0.0036	6.3220	0.0054	0.3760	0.0040	0.7442	1980	26	2057	12	2021	2	-1
N3-10	1.368	0.1467	0.0032	8.8150	0.0054	0.4360	0.0044	0.8110	2305	18	2332	14	2319	2	0
N3-11	1.106	0.1149	0.0033	5.0990	0.0054	0.3220	0.0042	0.7894	1875	25	1799	13	1835	2	2
N3-13	1.862	0.1143	0.0030	5.1984	0.0051	0.3300	0.0042	0.8129	1865	23	1838	13	1852	2	0
N3-14	0.812	0.1134	0.0035	5.1887	0.0052	0.3320	0.0039	0.7420	1850	27	1848	12	1850	2	0
N3-15	0.822	0.1199	0.0032	5.7174	0.0052	0.3460	0.0040	0.7770	1950	24	1915	12	1934	2	0
N3-16	1.538	0.1180	0.0034	5.4154	0.0051	0.3330	0.0039	0.7532	1925	25	1852	12	1887	2	1
N3-17	0.803	0.1863	0.0032	13.9161	0.0055	0.5420	0.0045	0.8192	2705	14	2791	14	2744	2	-1
N3-18	0.664	0.1146	0.0027	5.2120	0.0047	0.3300	0.0039	0.8192	1870	21	1838	12	1854	2	0
N3-19	0.891	0.1406	0.0035	7.0727	0.0054	0.3650	0.0041	0.7604	2230	21	2005	13	2120	2	5
N3-20	0.572	0.1568	0.0032	9.8541	0.0054	0.4560	0.0044	0.8138	2420	17	2421	14	2421	2	0
N3-21	0.613	0.1219	0.0028	5.9640	0.0046	0.3550	0.0037	0.7955	1980	20	1958	11	1970	2	0
N3-22	1.019	0.1689	0.0028	10.8240	0.0047	0.4650	0.0038	0.8001	2545	14	2461	12	2508	2	1
N3-23	0.608	0.1157	0.0033	5.4534	0.0052	0.3420	0.0040	0.7774	1885	25	1896	13	1893	2	0
N3-24	0.891	0.1146	0.0031	5.1330	0.0050	0.3250	0.0039	0.7823	1870	24	1814	12	1841	2	1
N3-25	0.541	0.1244	0.0035	5.8463	0.0052	0.3410	0.0038	0.7331	2015	25	1891	12	1953	2	3
N3-26	0.469	0.1125	0.0030	5.2250	0.0051	0.3370	0.0041	0.8045	1835	24	1872	13	1856	2	0
N3-27	0.747	0.1086	0.0027	4.9990	0.0045	0.3340	0.0036	0.8022	1775	22	1857	11	1819	2	-2
N3-28	0.773	0.1266	0.0030	5.8799	0.0051	0.3370	0.0041	0.8046	2050	21	1872	13	1958	2	4
N3-29	0.649	0.1157	0.0033	5.3258	0.0051	0.3340	0.0039	0.7626	1885	25	1857	12	1873	2	0
N3-30	1.274	0.1144	0.0030	5.2187	0.0049	0.3310	0.0039	0.7939	1865	23	1843	12	1855	2	0
N3-31	1.05	0.1720	0.0070	11.4731	0.0103	0.4840	0.0075	0.7289	2575	34	2544	24	2562	5	0
N3-32	1.98	0.1308	0.0069	6.3093	0.0094	0.3500	0.0064	0.6792	2105	46	1934	20	2019	4	4
N3-33	0.5	0.1295	0.0065	7.1747	0.0094	0.4020	0.0068	0.7231	2090	44	2178	21	2133	4	-2
N3-34	0.197	0.1149	0.0053	5.6532	0.0076	0.3570	0.0054	0.7136	1875	41	1967	17	1924	3	-2
N3-35	0.463	0.1107	0.0063	5.3855	0.0089	0.3530	0.0063	0.7071	1810	51	1948	20	1882	4	-3
N3-36	0.565	0.1690	0.0066	12.2745	0.0097	0.5270	0.0071	0.7328	2545	32	2728	22	2625	4	-3
N3-37	1.374	0.1245	0.0065	5.4220	0.0091	0.3160	0.0064	0.7019	2020	46	1770	20	1888	4	6
N3-38	1.631	0.1185	0.0061	5.5200	0.0085	0.3380	0.0060	0.7028	1930	45	1877	19	1903	4	1
N3-39	0.452	0.1247	0.0053	6.2900	0.0083	0.3660	0.0064	0.7679	2020	37	2010	20	2017	4	0
N3-40	0.57	0.1294	0.0066	6.7946	0.0092	0.3810	0.0064	0.6967	2085	44	2080	20	2085	4	0
N3-41	0.351	0.1930	0.0058	14.1506	0.0087	0.5320	0.0065	0.7453	2765	24	2749	20	2759	4	0
N3-42	0.524	0.1675	0.0057	11.5192	0.0081	0.4990	0.0057	0.7071	2530	28	2609	18	2566	4	-1
N3-43	0.526	0.1229	0.0066	4.9967	0.0090	0.2950	0.0062	0.6845	1995	47	1666	19	1818	4	9
N3-44	0.946	0.1770	0.0057	12.1969	0.0084	0.5000	0.0061	0.7274	2620	27	2613	19	2619	4	0
N3-45	0.769	0.1148	0.0049	5.2211	0.0076	0.3300	0.0058	0.7666	1875	38	1838	18	1856	3	0

Табл. 2. Результаты LA-ICP-MS U-Pb исследования детритовых цирконов из песчаников ванаварской и оскобинской свит скважины Юр-92

№	Th/U	Изотопные отношения						Rho	Возраст, млн. лет						D, %
		207Pb/ 206Pb	1σ abs	207Pb/ 235U	1σ abs	206Pb/ 238U	1σ abs		207Pb/ 206Pb	1σ	206Pb/ 238U	1σ	207Pb/ 235U	1σ	
N3-46	0.255	0.1770	0.0057	12.6360	0.0091	0.5180	0.0070	0.7743	2620	27	2690	22	2652	4	-1
N3-47	0.41	0.1170	0.0065	5.9984	0.0100	0.3720	0.0076	0.7603	1910	49	2038	24	1975	5	-3
N3-48	0.442	0.1203	0.0066	6.1842	0.0097	0.3730	0.0070	0.7274	1955	49	2043	22	2002	4	-2
N3-49	0.439	0.1254	0.0069	5.8069	0.0100	0.3360	0.0072	0.7211	2030	49	1867	23	1947	5	4
N3-50	1.02	0.1164	0.0047	4.9730	0.0070	0.3100	0.0053	0.7482	1900	36	1740	16	1814	3	4
N3-51	0.351	0.1172	0.0068	5.8148	0.0096	0.3600	0.0067	0.7033	1910	52	1982	21	1948	4	-1
N3-52	0.717	0.1194	0.0068	5.4138	0.0098	0.3290	0.0071	0.7217	1945	50	1833	22	1887	4	2
N3-53	0.665	0.1153	0.0063	5.4186	0.0095	0.3410	0.0071	0.7471	1880	49	1891	22	1887	4	0
N3-54	0.697	0.1163	0.0049	5.4656	0.0075	0.3410	0.0057	0.7549	1895	38	1891	18	1895	3	0
N3-55	0.604	0.1132	0.0044	5.0235	0.0060	0.3220	0.0042	0.6905	1850	34	1799	13	1823	3	1
N3-56	0.35	0.1223	0.0056	5.8150	0.0087	0.3450	0.0067	0.7710	1985	40	1910	21	1948	4	1
N3-57	0.727	0.1336	0.0064	7.1809	0.0095	0.3900	0.0070	0.7357	2145	42	2122	22	2134	4	0
N3-58	0.575	0.1152	0.0050	5.8108	0.0073	0.3660	0.0053	0.7291	1880	38	2010	17	1948	3	-3
N3-59	0.535	0.1198	0.0051	5.9108	0.0074	0.3580	0.0054	0.7266	1950	38	1972	17	1962	3	0
N3-60	0.926	0.1750	0.0064	11.6008	0.0088	0.4810	0.0061	0.6926	2605	30	2531	19	2572	4	1
N3-61	0.799	0.1314	0.0059	7.4429	0.0084	0.4110	0.0059	0.7059	2115	39	2219	19	2166	4	-2
N3-62	1.441	0.1308	0.0051	7.2287	0.0071	0.4010	0.0048	0.6854	2105	34	2173	15	2140	3	-1
N3-63	1.534	0.1100	0.0049	4.7299	0.0076	0.3120	0.0059	0.7655	1795	40	1750	18	1772	3	1
N3-64	1.812	0.1148	0.0065	5.1578	0.0088	0.3260	0.0059	0.6716	1875	51	1818	19	1845	4	1
N3-66	0.88	0.1782	0.0050	12.1568	0.0081	0.4950	0.0063	0.7830	2635	23	2592	20	2616	4	0
N3-68	1.531	0.1798	0.0054	11.5225	0.0080	0.4650	0.0059	0.7386	2650	24	2461	18	2566	4	4
N3-69	0.403	0.1177	0.0056	5.4179	0.0081	0.3340	0.0058	0.7172	1920	42	1857	18	1887	4	1
N3-70	2.309	0.1657	0.0042	10.3677	0.0061	0.4540	0.0045	0.7352	2510	21	2413	14	2468	3	2
N3-73	0.835	0.1159	0.0060	5.6705	0.0091	0.3550	0.0068	0.7541	1890	46	1958	22	1926	4	-1
N3-74	0.788	0.1860	0.0071	12.6120	0.0099	0.4920	0.0070	0.7032	2705	31	2579	22	2651	5	2
N3-75	0.762	0.1377	0.0064	6.9268	0.0092	0.3650	0.0067	0.7207	2195	40	2005	21	2102	4	4
N3-76	1.534	0.1176	0.0063	5.0567	0.0093	0.3120	0.0068	0.7345	1915	48	1750	21	1828	4	4
N3-77	0.169	0.1145	0.0052	5.3495	0.0079	0.3390	0.0060	0.7571	1870	40	1881	19	1876	4	0
N3-78	0.951	0.1197	0.0055	5.7244	0.0076	0.3470	0.0053	0.6913	1950	41	1920	17	1935	3	0
N3-79	2.114	0.1870	0.0060	12.3448	0.0087	0.4790	0.0063	0.7283	2715	26	2522	20	2630	4	4
N3-80	0.463	0.1172	0.0054	5.2495	0.0085	0.3250	0.0065	0.7720	1910	41	1814	21	1860	4	2
N3-81	1.302	0.1139	0.0053	5.2587	0.0074	0.3350	0.0052	0.7001	1860	41	1862	16	1862	3	0
N3-82	0.476	0.1146	0.0048	5.5279	0.0071	0.3500	0.0052	0.7361	1870	37	1934	16	1904	3	-1
N3-83	1.575	0.1675	0.0055	10.3880	0.0082	0.4500	0.0061	0.7403	2530	27	2395	19	2469	4	3
N3-84	0.748	0.1133	0.0056	5.1997	0.0090	0.3330	0.0070	0.7772	1850	45	1852	22	1852	4	0
N3-85	0.663	0.1221	0.0076	5.8560	0.0101	0.3480	0.0067	0.6604	1985	55	1925	21	1954	5	1
N3-86	1.603	0.1117	0.0036	4.6675	0.0049	0.3032	0.0033	0.6712	1825	29	1707	10	1761	2	3
N3-87	0.901	0.1150	0.0050	5.5155	0.0079	0.3480	0.0061	0.7760	1875	39	1925	19	1903	4	-1
N3-88	1.326	0.1187	0.0061	5.7747	0.0084	0.3530	0.0058	0.6882	1935	45	1948	18	1942	4	0
N3-89	1.119	0.1204	0.0052	5.5422	0.0078	0.3340	0.0058	0.7403	1960	38	1857	18	1907	3	2
N3-90	1.988	0.1227	0.0063	5.6988	0.0085	0.3370	0.0057	0.6741	1995	45	1872	18	1931	4	3
N3-91	0.654	0.1680	0.0060	11.6693	0.0085	0.5040	0.0060	0.7071	2535	30	2630	19	2578	4	-2
N3-92	0.999	0.1147	0.0064	5.4220	0.0091	0.3430	0.0065	0.7098	1870	50	1901	20	1888	4	0
N3-93	0.741	0.1171	0.0075	5.7453	0.0099	0.3560	0.0065	0.6573	1910	57	1963	21	1938	5	-1
N3-94	0.356	0.1277	0.0060	6.6174	0.0083	0.3760	0.0057	0.6850	2065	41	2057	18	2061	4	0

Табл. 2. Результаты LA-ICP-MS U-Pb исследования детритовых цирконов из песчаников ванаварской и оскобинской свит скважины Юр-92

Рис. 8. Морфология и строение зерен цирконов в режиме катодоллюминесценции с расположением лазерного кратера (красный круг): (а) – ванаварская свита; (б) – нижняя пачка особинской свиты; (в) – средняя пачка особинской свиты

Рис. 9. Гистограммы относительной вероятности возраста детритовых цирконов из терригенных пород ванаварской и оскобинской свит: а) – ванаварская свита; б) – нижняя пачка оскобинской свиты; в) – средняя пачка оскобинской свиты

Обсуждение результатов

Проведенные петрографические, литогеохимические и U-Pb геохронологические исследования терригенных пород ванаварской и оскобинской свит Камовского свода Байкитской антеклизы, несмотря на определенные сходства петрографических характеристик, позволили выявить определенные различия в их литогеохимических составах, а также в возрасте детритовых цирконов.

Так, терригенные породы ванаварской свиты характеризуются средней и хорошей степенью сортировки и окатанности обломочного материала. Эти породы обнаруживают преимущественно полевошпат-кварцевый состав и соответствуют аркозам. Набор акцессорных минералов в совокупности с составом обломков пород свидетельствует о преобладании в области источника магматических и метаморфических пород кислого состава. Нормированные на хондрит спектры распределения редкоземельных элементов, построенные для изученных песчаников ванаварской свиты, обнаруживают фракционированные спектры распределения РЗЭ, обогащение легкими лантаноидами, а также фиксируют как наличие слабой отрицательной европиевой аномалии, так и положительную европиевую аномалию, что свидетельствует о смешанном составе пород в области источника (Rollinson, 1994).

Изученные терригенные породы нижней и средней пачек оскобинской свиты характеризуются средней и хорошей степенью сортировки и окатанности обломочного материала. Эти породы обнаруживают преимущественно полевошпат-кварцевый состав. Набор акцессорных минералов, наряду с составом обломков пород, свидетельствует о смешанном составе пород в области источника. Нормированные на хондрит спектры распределения редкоземельных элементов, построенные для изученных песчаников оскобинской свиты, обнаруживают

фракционированные спектры распределения РЗЭ, обогащение легкими лантаноидами. Для пород нижней пачки оскобинской свиты отмечается наличие отрицательной европиевой аномалии на спектрах РЗЭ, в то время как песчаники средней пачки оскобинской свиты обнаруживают отсутствие европиевой аномалии, что подтверждает вывод о смешанном составе пород в области их источника.

Расчитанные значения индекса химического выветривания (CIA) (Nesbitt, Young, 1982) и индекса химического состава (ICV) (Cox, Lowe, 1995), которые обычно используются для оценки степени зрелости и химического изменения пород в источнике обломочного материала для ванаварской (CIA = 60.31–72.27; ICV = 0.57–0.97) и средней пачки оскобинской свиты (CIA = 53.18–65.68; ICV = 0.71–1.05) перекрываются между собой и на диаграмме CIA – ICV (рис. 10) располагаются в поле зрелых, слабо выветренных пород. Для терригенных пород нижней пачки оскобинской свиты отмечаются пониженные значения CIA (22.73–35.91) и высокие значения ICV (2.13–3.26), на диаграмме CIA-ICV (рис. 10) их фигуративные точки попадают в поле незрелых, слабо выветренных пород. Что подтверждает выводы о различных источниках сноса в бассейны седиментации этих пород.

На основании литогеохимических данных были предложены критерии, позволяющие идентифицировать рассматриваемые стратиграфические подразделения. Медианное значение CIA для пород нижней пачки оскобинской свиты составляет 26.6, а для средней пачки и ванаварской свит – 58.0 и 62.6 соответственно. Индикатор ICV демонстрирует высокое значение медианы для пород нижней пачки 2.48, по сравнению с породами средней пачки (0.9) и ванаварской свиты (0.89).

По медианным значениям Eu/Eu* исследуемые породы хорошо дифференцируются в разрезе: ванаварская свита (2.1), средняя (0.75) и нижняя (0.58) пачки оскобинской

свиты. $(La/Yb)_n$ демонстрирует поступательное уменьшение медианных значений в ряду ванаварская свита (10.87) – нижняя пачка (8.81) – средняя пачка (6.02) оскобинской свиты.

U-Pb (LA-ICP-MS) возраст детритовых цирконов из песчаника ванаварской свиты, а также из алевропесчаников нижней и средней пачек оскобинской свиты также демонстрируют определенные отличия. А именно, детритовые цирконы из песчаника ванаварской свиты обнаруживают преимущественно архейские и раннепротерозойские оценки возраста детритовых цирконов. Для песчаников вышележащей нижней пачки оскобинской свиты, наряду с обильными популяциями детритовых цирконов архейского и раннепротерозойского возраста, характерно наличие детритовых цирконов ранне- и позднерифейского возраста. В средней пачке оскобинской свиты наблюдается меньшее количество определений архейского возраста, обильная популяция детритовых цирконов, соответствующая раннему протерозою и рифею, а также одно зерно вендского возраста (рис. 11).

Совокупность новых данных о вещественном составе и U-Pb (LA-ICP-MS) возрасте детритовых цирконов из терригенных пород ванаварской свиты непского горизонта и оскобинской свиты тирского горизонта позволяют предположить, что седиментация ванаварской свиты происходила на пассивной континентальной окраине Сибирской платформы, за счет разрушения магматических и метаморфических пород, слагающих фундамент южной окраины Сибирской платформы (Rojas-Agramonte et al., 2011). При этом наибольшее количество детритовых цирконов соответствует возрасту пород раннепротерозойского Южно-Сибирского постколлизийного магматического пояса (Donskaya, 2020; Donskaya, Gladkochub, 2021). Популяция детритовых цирконов архейского возраста может быть связана с гранитоидами Юрубченского массива фундамента Камовского свода Байкитской антеклизы, U-Pb возраст которых составляет 2562 ± 16 млн лет (Самсонов и др., 2021). Кроме того, в качестве возможного источника обломочного материала для терригенных пород ванаварской свиты, могут рассматриваться песчаники камовской серии рифея, для которых характерна

значительная популяция детритовых цирконов архейского возраста (Зайцева и др., 2022). Косвенно, на присутствие в песчаниках ванаварской свиты продуктов переотложения более древних осадочных пород камовской серии могут указывать обломки глинистых пород, диагностированные при петрографических исследованиях.

В сравнении с результатами U-Pb исследований детритовых цирконов из разновозрастных терригенных пород, распространенных на юге Непско-Ботуобинской антеклизы и представленных непской свитой непского регионального горизонта (Мотова и др., 2022), в приведенных в данной работе результатах U-Pb исследований возраста детритовых цирконов в породах ванаварской свиты отсутствуют детритовые цирконы позднепротерозойского возраста. Описанное может говорить как о более раннем накоплении пород ванаварской свиты Байкитской антеклизы, так и о том, что в непское время террейны и островные дуги, в настоящее время входящие в состав северного сегмента Центрально-Азиатского складчатого пояса, располагались ближе к южной периферии района Непско-Ботуобинской антеклизы, чем к юго-западной части Байкитской антеклизы.

Возраст детритовых цирконов из терригенных пород нижней и средней пачек оскобинской свиты тирского регионального стратиграфического горизонта демонстрирует наличие как архей-раннепротерозойских детритовых цирконов, соответствующих возрасту пород фундамента южной окраины Сибирской платформы (Rojas-Agramonte et al., 2011), так и позднепротерозойских популяций, сопоставимых с возрастом террейнов и островных дуг, в настоящее время входящих в структуру северного сегмента Центрально-Азиатского складчатого пояса (Donskaya et al., 2017), либо с возрастом пород Восточно-Ангарского блока Енисейского кряжа (Прияткина и др., 2019). Предполагается, что породы оскобинской свиты накапливались в периферийном форландовом бассейне, формирование которого связано с вендскими аккреционно-коллизийными событиями, сопровождавшимися процессами закрытия Палеоазиатского океана вдоль южной окраины Сибирского кратона и начальными этапами становления северного сегмента Центрально-Азиатского

Рис. 10. Диаграмма CIA (индекс химического выветривания) (Nesbitt, Young, 1982) / ICV (индекс зрелости осадков) (Cox, Lowe, 1995). Свиты: 1 – ванаварская; 2 – оскобинская (нижняя пачка); 3 – оскобинская (средняя пачка).

Рис. 11. Сопоставление возраста детритовых цирконов из песчаников ванаварской свиты непского горизонта и нижней и средней пачек оскобинской свиты тирского горизонта внутренних районов Сибирской платформы, пород террейнов северного сегмента Центрально-Азиатского складчатого пояса по (Donskaya et al., 2017) и магматических и метаморфических пород фундамента южной окраины Сибирской платформы по (Rojas-Agramonte et al., 2011)

складчатого пояса (Советов, 2018; Gladkochub et al., 2019; Romanov et al., 2021).

Таким образом, полученные результаты исследований возраста детритовых цирконов свидетельствуют о том, что в ванаварское время направление сноса терригенного материала было с Сибирского кратона в сторону открытого моря, а в оскобинское время помимо сноса обломочного материала с кратона начинают преобладать дополнительные источники сноса с террейнов и островных дуг, располагающихся в акватории Палеоазиатского океана. Это согласуется с текущими фаціальными представлениями об осадконакоплении: ванаварская свита накапливалась преимущественно в аллювиальных и дельтовых обстановках; оскобинская свита – в приливно-отливных и мелко-водно-морских условиях (Квачко и др., 2017).

Заключение

Результаты петрографических, литогеохимических и U-Pb геохронологических исследований терригенных пород ванаварской и оскобинской свит Камовского свода Байкитской антеклизы Сибирской платформы позволили выявить определенные различия в их характеристиках.

Для терригенных пород ванаварской свиты непского регионального стратиграфического горизонта в качестве основных источников обломочного материала установлены преимущественно породы кислого состава. Вещественные характеристики изученных пород оскобинской свиты свидетельствуют о смешанном (кислом и основном) составе пород в области их источника.

U-Pb (LA-ICP-MS) геохронологические исследования детритовых цирконов позволили установить архейские и раннепротерозойские популяции детритовых цирконов. Породы оскобинской свиты обнаруживают архейские, раннепротерозойские и позднепротерозойские основные возрастные популяции детритовых цирконов. При этом, отмечается преобладание ранне- и позднепротерозойских популяций детритовых цирконов над архейскими.

Совокупность вещественных характеристик ванаварской свиты, а также результаты изучения возраста детритовых цирконов, с учетом опубликованных данных о литолого-фаціальных особенностях этих пород, позволили предположить, что седиментация ванаварской свиты происходила на пассивной континентальной окраине, за счет разрушения магматических и метаморфических пород, слагающих фундамент южной окраины Сибирской платформы, и, возможно, за счет размыва нижележащих песчаников камовской серии рифея. Затем имела место трансформация в периферийный форландовый бассейн, в котором накапливались терригенные породы оскобинской свиты, за счет обломочного материала, поступающего как с территории Сибирской платформы, так и с террейнов и островных дуг северного сегмента Центрально-Азиатского складчатого пояса.

Финансирование

Исследования выполнены при поддержке Российского научного фонда (грант № 23-17-00196, <https://rscf.ru/project/23-17-00196/>).

Литература

Горохов И.М., Васильева И.М., Кузнецов А.Б., Ризванова Н.Г., Константинова Г.В. (2023). Метод ступенчатого растворения в изучении изотопной хемотратиграфии и геохронологии рифейских пород Байкитского поднятия. *Геохимия*, 68(7), с. 669–686. <https://doi.org/10.31857/S0016752523070038>

Горохов И.М., Кузнецов А.Б., Васильева И.М., Крамчанинов А.Ю., Ризванова Н.Г., Константинова Г.В. (2021). Pb-Pb-возраст карбонатных пород камовской серии, Байкитская антеклизы Сибирской платформы. *Доклады РАН. Науки о Земле*, 500(1), с. 12–17. <https://doi.org/10.1134/S1028334X21090105>

Зайцева Т.С., Кузнецов А.Б., Иванова Н.А., Масленников М.А., Пустыльников В.В., Турченко Т.Л., Наговицин К.Е. (2019). Rb-Sr-возраст рифейских глауконитов камовской серии, Байкитская антеклизы Сибирской платформы. *Доклады РАН*, 488(1), с. 52–57. <https://doi.org/10.31857/S0869-5652488152-57>

Зайцева Т.С., Прияткина Н.С., Горохов И.М., Ковач В.П., Адамская Е.В., Гороховский Б.М., Плоткина Ю.В. (2022). Обломочные цирконы из рифейских отложений байкитской антеклизы (сибирская платформа): U-Th-Pb данные. *Пустоваловские чтения 2022: материалы традиционной конференции, посвященной 120-летию Леонида Васильевича Пустовалова*. Москва: РГУ имени И.М. Губкина, с. 48–50.

Квачко С.К., Козьяев А.А. (2017). Условия осадконакопления ванаварской и оскобинской свит в пределах одного из месторождений восточной Сибири. *Современные проблемы седиментологии в нефтегазовом инжиниринге: труды III Всероссийского научно-практического седиментологического совещания*. Томск: Издательство ЦППС НД, с. 191–194.

- Краевский Б.Г., Якшин М.С., Наговицин К.Е. (2018). Региональная стратиграфическая схема рифейских отложений западной части Сибирской платформы. *Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири*, (5), с. 4–14.
- Логвиненко Н.В. (1974). Петрография осадочных пород (с основами методики исследования. М.: Высшая школа, 400 с.
- Макет региональной корреляционной стратиграфической схемы вендских отложений Сибирской платформы (2022). Новосибирск: СНИИГГиМС, 159 с.
- Мельников Н.В. (1982). Корреляция подсолевых нефтегазоносных отложений юга Сибирской платформы. *Геология и геофизика*, (3), с. 29–41.
- Мельников Н.В. (2018). Венд-кембрийский соленосный бассейн Сибирской платформы (Стратиграфия, история развития). Изд. 2-е, доп. Новосибирск: СНИИГГиМС, 177 с.
- Мельников Н.В., Якшин М.С., Шишкин Б.Б., Ефимов А.О., Карлова Г.А., Килина Л.И., Константинова Л.Н., Кочнев Б.Б., Краевский Б.Г., Мельников П.Н., Наговицин К.Е., Постников А.А., Рябкова Л.В., Терлеев А.А., Хабаров Е.М. (2005). Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов Сибири. Рифей и венд Сибирской платформы и ее складчатого обрамления. Новосибирск: Гео, 428 с.
- Методические рекомендации к корреляции разрезов скважин (2013). Под ред. И.С. Гутмана. М.: ООО «Издательский дом Недра», 112 с.
- Мотова З.Л., Плюснин А.В. (2022). Источники вещества и условия седиментации вендских терригенных пород юга Непско-Ботубинской антеклизы (Сибирская платформа). *Геодинамика и тектонофизика*, 13(5). <https://doi.org/10.5800/GT-2022-13-5-0670>
- Общая стратиграфическая шкала. (2024). ВСЕГЕИ: Москва. https://vsegei.ru/ru/about/msk/str_scale/os_scale-03-24.pdf
- Плюснин А.В., Мотова З. Л., Валева Р.Р., Томилина Е.М., Фомин В. А. (2024). Состав и условия формирования терригенных пород непской свиты вендского возраста центральной части Непско-Ботубинской антеклизы (по результатам изучения керн скважины ВЧ-3Х). Геосферные исследования (в редакции).
- Прияткина Н.С., Кузнецов Н.Б., Рудько С.В., Шацилло А.В., Худoley А.К., Романюк Т.В., Маслов А.В. (2019) Погоруйская свита протерозоя Енисейского кряжа: возраст и источники сноса по данным U-Pb-изотопного датирования обломочных цирконов. *Доклады РАН*, 484, с. 195–199. <https://doi.org/10.1134/S1028334X19010136>
- Решения четвертого межведомственного регионального совещания по уточнению и дополнению стратиграфических схем венда и кембрия внутренних районов Сибирской платформы (1989). Новосибирск: СНИИГГиМС, с. 40.
- Самсонов А.В., Постников А.В., Спиридонов В.А., Ларионова Ю.О., Ларионов А.Н., Травин А.В., Постникова О.В., Соловьева Н.В., Сабиров И.А., Спиридонов И.В. (2021). Неорархейские гранитоиды на западе Тунгусского супертеррейна, фундамент Сибирской платформы: геохронология, петрология, тектоническое значение. *Петрология*, 29(5), с. 451–477. <https://doi.org/10.1134/S0869591121050064>
- Советов Ю.К. (2018). Седиментология и стратиграфическая корреляция вендских отложений на юго-западе Сибирской платформы: выдающийся вклад внешнего источника кластического материала в образование осадочных систем. *Литосфера*, 18(1), pp. 20–45. <https://doi.org/10.24930/1681-9004-2018-18-1-020-045>
- Фомин В.А., Вахромеев А.Г., Мотова З.Л., Струнов А.В., Машенькин Д.В., Фомина В.В., Плюснин А.В. (2024). Особенности геологического строения и перспективы нефтегазоносности рифейских и вендских осадочных толщ юго-восточной части камовского свода байкитской антеклизы. *Геодинамика и тектонофизика*, 15(6), с. 1–16. <https://doi.org/10.5800/GT-2024-15-6-0802>
- Харахинов В.В., Шленкин С.И. (2011). Нефтегазоносность докембрийских толщ Восточной Сибири. Москва: Научный мир, 420 с.
- Хрущева М.О., Тишин П.А., Чернышов А.И. (2019). Геохимическая характеристика рассолов и современных эвапоритов урочища Талое Озеро (Республика Хакасия). *Известия Иркутского государственного университета*. Серия Науки о Земле, 30, с. 130–140. <https://doi.org/10.26516/2073-3402.2019.30.130>
- Black L.P., Kamo S.L., Allen C.M., Davis D.W., Aleinikoff J.N., Valley J.W., Mundil Roland, Campbell I.H., Korsch R.J., Williams I.S., Foudoulis, C. (2004). Improved ²⁰⁶Pb/²³⁸U microprobe geochronology by the monitoring of a trace-element-related matrix effect; SHRIMP, ID-TIMS, ELA-ICP-MS and oxygen isotope documentation for a series of zircon standards. *Chemical Geology*, 205, pp. 115–140. <https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2004.01.003>
- Boynton W.V. (1984) Geochemistry of the rare earth elements: meteorite studies. Henderson P. (ed.). Rare earth element geochemistry. Elsevier, pp. 63–114. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-42148-7.50008-3>
- Cohen K.M., Harper D.A.T., Gibbard P.L., Car N. (2022). The ICS International Chronostratigraphic Chart, February. <http://www.stratigraphy.org/ICSChart/ChronostratChart2022-02.pdf>
- Cox R., Lowe D.R.A. (1995). Conceptual review of regional-scale controls on the composition of clastic sediment and the co-evolution of continental blocks and their sedimentary cover. *Journal of Sedimentary Research*, 1, pp. 1–12.
- Donskaya T.V. (2020). Assembly of the Siberian Craton: Constraints from Paleoproterozoic granitoids. *Precambrian Res.*, 348 p. <https://doi.org/10.1016/j.precamres.2020.105869>
- Donskaya T.V., Gladkochub D.P., Fedorovsky V.S., Sklyarov E.V., Cho M., Sergeev S.A., Demonterova E.I., Mazukabzov A.M., Lepekina E.N., Cheong W., Kim J. (2017). Pre-collisional (> 0.5 Ga) complexes of the Olkhon terrane (southern Siberia) as an echo of events in the Central Asian Orogenic Belt. *Gondwana Research*, 42, pp. 243–263. <https://doi.org/10.1016/j.gr.2016.10.016>
- Donskaya T.V., Gladkochub D.P. (2021). Post-collisional magmatism of 1.88–1.84 Ga in the southern Siberian Craton: An overview. *Precambrian Res.*, 367 p. <https://doi.org/10.1016/j.precamres.2021.106447>
- Gladkochub D.P., Donskaya T.V., Stanevich A.M., Pisarevsky S.A., Zhang S., Motova Z.L., Mazukabzov A.M., Li H. (2019). U-Pb detrital zircon geochronology and provenance of Neoproterozoic sedimentary rocks in southern Siberia: New insights into breakup of Rodinia and opening of Paleo-Asian Ocean. *Gondwana Research*, 65, pp. 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.gr.2018.07.007>
- Jackson S.E., Pearson N.J., Griffin W.L., Belousova E.A. (2004). The application of laser ablation inductively coupled plasma-mass spectrometry to in situ U–Pb zircon geochronology. *Chemical Geology*, 211, pp. 47–69. <https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2004.06.017>
- Khabarov E.M., Ponomarchuk V.A., Morozova I.P., Varaksina I.V., Saraev S.V. (2002). Fluctuations of the Sea Level and Carbon Isotope Composition of Carbonates in a Riphean Petroliferous Basin on the Western Margin of the Siberian Craton (Baikit Uplift). *Russian Geology and Geophysics*, 43(3), pp. 211–239.
- Khabarov E.M., Varaksina I.V. (2011). The Structure and Depositional Environments of Mesoproterozoic Petroliferous Carbonate Complexes in the Western Siberian Craton. *Russian Geology and Geophysics*, 52(8), pp. 923–944. <https://doi.org/10.1016/j.rgg.2011.07.014>
- Nesbitt H.W., Young G.M. (1982). Early Proterozoic climates and plate motions inferred from major element chemistry of lutites. *Nature*, 299, pp. 715–717. <https://doi.org/10.1038/299715a0>
- Paces J.B., Miller J.D. (1993). Precise U-Pb Ages of the Duluth Complex and Related Mafic Intrusions, Northeastern Minnesota: Geochronological Insights to Physical, Petrogenetic, Paleomagnetic, and Tectonomagmatic Processes Associated With the 1.1 Ga Midcontinent Rift System. *Journal of Geophysical Research*, 98, pp. 13997–14013. <https://doi.org/10.1029/93JB01159>
- Pettijohn F.I., Potter P.E., Siever R. (1972). Sand and sandstone: New York, Springer, 618 p. <https://doi.org/10.1007/978-1-4615-9974-6>
- Powerman V.I., Buyantuev M.D., Ivanov A.V. (2021). A Review of Detrital Zircon Data Treatment, and Launch of a New Tool ‘Dezirteer’ along with the Suggested Universal Workflow. *Chemical Geology*, 583, pp. 119–139. <https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2021.120437>
- Rojas-Agramonte Y., Kröner A., Demoux A., Xia X., Wang W., Donskaya T., Liu D., Sun M. (2011). Detrital and xenocrystic zircon ages from Neoproterozoic to Palaeozoic arc terranes of Mongolia: Significance for the origin of crustal fragments in the Central Asian Orogenic Belt. *Gondwana Research*, 19(3), pp. 751–763. <https://doi.org/10.1016/j.gr.2010.10.004>
- Rollinson H.R. (1994). Using geochemical data: evaluation, presentation, interpretation. Essex. London Group UK Ltd, 352 p.
- Romanov M., Sovetov Ju.K., Vernikovskiy V.A., Rosenbaum G., Wilde S.A., Vernikovskaya A.E., Matushkin N.Yu., Kadilnikov P.I. (2021). Late Neoproterozoic evolution of the southwestern margin of the Siberian Craton: evidence from sedimentology, geochronology and detrital zircon analysis. *International Geology Review*, 63(13), 1658–1681. <https://doi.org/10.1080/00206814.2020.1790044>
- Stern R.A., Bodorkos S., Kamo S.L., Hickman A.H., Corfu F. (2009). Measurement of SIMS Instrumental Mass Fractionation of Pb Isotopes During Zircon Dating. *Geostandards and Geoanalytical Research*, 33, pp. 145–168. <https://doi.org/10.1111/j.1751-908X.2009.00023.x>

Wiedenbeck M., Alle P., Corfu F., Griffin W.L., Meier M., Oberli F., Von Quadt A., Roddick, J.C., Spiegel W. (1995). Three natural zircon standards for U-Th-Pb, Lu-Hf, trace element and REE analyses. *Geostandards Newsletter*, 19, pp. 1–23. <https://doi.org/10.1111/j.1751-908X.1995.tb00147.x>

Сведения об авторах

Алексей Владимирович Плюснин – кандидат геол.-минерал. наук, эксперт по седиментологии, УТО ИиХСИ, ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»; Научный консультант Департамента нефтегазового инжиниринга ПИНШ, Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти»

Россия, 423462, Республика Татарстан, Альметьевск, ул. Ленина, д. 2

e-mail: plusnin@agni-rt.ru

Зинаида Леонидовна Мотова – кандидат геол.-минерал. наук, старший научный сотрудник лаборатории палеогеодинамики, Институт земной коры СО РАН

Россия, 664033, Иркутск, ул. Лермонтова, д. 128

e-mail: motova@crust.irk.ru

Игорь Викторович Афонин – кандидат геол.-минерал. наук, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории структурной петрологии и минерагении, Национальный исследовательский Томский государственный университет

Россия, 634050, Томск, пр. Ленина, д. 36

e-mail: heaven05@list.ru

Елена Михайловна Томилина – старший преподаватель кафедры минералогии и петрографии, Пермский государственный национальный исследовательский университет

Россия, 614990, Пермь, ул. Букирева, д. 15

e-mail: tomilinaelena.psu@yandex.ru

Дмитрий Андреевич Староселец – заместитель генерального директора по разработке, ООО «ГудГео»
Россия, 625000, Тюмень, ул. Республики, д. 57
e-mail: d_star1997@mail.ru

Евгений Евгеньевич Белозеров – ведущий специалист отдел геологоразведочных работ управления геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования, АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания»

Россия, 660049, Красноярск, пр. Мира, д. 36

e-mail: BelozerovEE@vsnk.ru

Ирик Рашидович Халиков – начальник отдела геологоразведочных работ, управление геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования, АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания»

Россия, 660049, Красноярск, пр. Мира, д. 36

e-mail: HalikovIR@vsnk.rosneft.ru

Михаил Викторович Шалдыбин – кандидат геол.-минерал. наук, руководитель группы седиментологии, АО «ТомскНИПИнефть»

Россия, 634027, Томск, Проспект Мира, д. 72

e-mail: ShaldybinMV@tomsknipi.ru

Игорь Александрович Яшин – кандидат геол.-минерал. наук, начальник отдела региональной геологии и геологоразведочных работ, ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»

Россия, 660098, Красноярск, ул. 9 Мая, д. 65д

e-mail: YashinIA@knipi.rosneft.ru

Владимир Александрович Фомин – аспирант, Институт земной коры СО РАН

Россия, 664033, Иркутск, ул. Лермонтова, д. 128

e-mail: fovarid@gmail.com

Статья поступила в редакцию 18.10.2024;

Принята к публикации 10.03.2025;

Опубликована 30.03.2025

IN ENGLISH

ORIGINAL ARTICLE

Results of Studying the Material Composition and U-Pb (LA-ICP-MS) Age of Detrital Zircons From Terrigenous Rocks of the Vanavara and Oskobinskaya Formations of the Kamov Arch of the Baikit Antelise

A.V. Plusnin^{1,2*}, *Z.L. Motova*³, *I.V. Afonin*⁴, *E.M. Tomilina*⁵, *D.A. Staroselets*⁶, *E.E. Belozеров*⁷, *I.R. Khalikov*⁷, *M.V. Shaldybin*⁸, *I.A. Yashin*¹, *V.A. Fomin*³

¹RN-KrasnoyarskNIPIneft LLC, Krasnoyarsk, Russian Federation

²Almetyevsk State Technological University “Petroleum High School”, Almetyevsk, Russian Federation

³Institute of Earth Crust of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Irkutsk, Russian Federation

⁴National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

⁵Perm State National Research University, Perm, Russian Federation

⁶Gudgeo LLC, Tyumen, Russian Federation

⁷East Siberian Oil and Gas Company JSC, Krasnoyarsk, Russian Federation

⁸TomskNIPIneft PJSC, Tomsk, Russian Federation

*Corresponding author: Alexey V. Plusnin, e-mail: a.v.plusnin@mail.ru

Abstract. The paper presents the results of studies on sandstones from the Vanavara and Oskobinskaya formations, which are part of the Nepa and Torskiy regional stratigraphic horizons, respectively. These formations were studied using the core from the Yur-92 deep well, located within the Kamov Arch of the Baikit Antecline on the Siberian Platform. A detailed lithological description of a core with a total thickness of 89 meters is provided. For 13 sandstone samples, the following studies were conducted: petrographic analysis of thin sections, definition of major petrogenic oxide content, definition of impurity and trace element content using mass spectrometry with inductively coupled plasma, and geochronological (U-Pb) analysis of detrital zircon grains.

It was found that the Vanavara formation is characterized by a terrigenous composition, while the Oskobinskaya formation is composed of terrigenous, sulfate, and carbonate rocks and can be divided into three members. According to the results of petrographic analysis of rocks from the Vanavara and Oskobinskaya formations, there is generally a similarity in terms of the degree of roundness and sorting of detrital material, as well as the composition of both rock-forming and accessory minerals including rock fragments such as quartzites, micaschists, and granitoids (both metamorphic and igneous rock types), as well as clay rocks, likely argillites. The material composition of all the studied sandstones from the Vanavara and Oskobinskaya formations corresponds to that of arkoses. Based on a set of litho-geochemical characteristics, it appears that the source material for the deposits of the Vanavara formation was primarily derived from rocks with an acidic composition, while the terrigenous rocks from the Oskobinskaya formation may have originated from both acidic and intermediate rocks. U-Pb (LA-ICP-MS) dating of detrital zircon grains from terrigenous rocks of the Vanavara Formation indicates that the main source of sediments in the basin where they were deposited was Archean and Early Proterozoic rocks from the Siberian Platform basement.

The Oskobinskaya Formation was deposited as a result of the erosion of Archean, Early Proterozoic, and late Riphean rocks that formed the basement of the Siberian platform and the northern segment of the Central Asian fold belt, as well as possibly rocks that make up the East Angara Block of the Yenisei Ridge. Based on the characteristics of the Vanavara and Oskobinskaya formations, combined with the results of zircon dating and published data on lithofacies, it is suggested that the Vanavara formation was deposited on the passive margin of the Siberian platform. Then, there was a transformation into a peripheral foreland basin in which terrigenous rocks from the Oskobinskaya formation accumulated.

Keywords: Siberian platform, Baikit antecline, Vanavara formation, Oskoba formation, Vendian, litho-geochemistry, detrital zircons, paleogeodynamics

Recommended citation: Plusnin A.V., Motova Z.L., Afonin I.V., Tomilina E.M., Staroselets D.A., Belozero E.E., Khalikov I.R., Shaldybin M.V., Yashin I.A., Fomin V.A. (2025). Results of Studying the Material Composition and U-Pb (LA-ICP-MS) Age of Detrital Zircons From Terrigenous Rocks of the Vanavara and Oskobinskaya Formations of the Kamov Arch of the Baikit Antelise. *Georesursy = Georesources*, 27(1), pp. 236–260. <https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.26>

References

- Black L.P., Kamo S.L., Allen C.M., Davis D.W., Aleinikoff J.N., Valley J.W., Mundil Roland, Campbell I.H., Korsch R.J., Williams I.S., Foudoulis, C. (2004). Improved ²⁰⁶Pb/²³⁸U microprobe geochronology by the monitoring of a trace-element-related matrix effect; SHRIMP, ID-TIMS, ELA-ICP-MS and oxygen isotope documentation for a series of zircon standards. *Chemical Geology*, 205, pp. 115–140. <https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2004.01.003>
- Boynton W.V. (1984) Geochemistry of the rare earth elements: meteorite studies. Henderson P. (ed.). Rare earth element geochemistry. Elsevier, pp. 63–114. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-42148-7.50008-3>
- Cohen K.M., Harper D.A.T., Gibbard P.L., Car N. (2022). The ICS International Chronostratigraphic Chart, February. <http://www.stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2022-02.pdf>
- Cox R., Lowe D.R.A. (1995). Conceptual review of regional-scale controls on the composition of clastic sediment and the co-evolution of continental blocks and their sedimentary cover. *Journal of Sedimentary Research*, 1, pp. 1–12.
- Decisions of the Fourth Interdepartmental Regional Meeting on Clarification and Completion of Stratigraphic Schemes of the Vendian and Cambrian of the Interior of the Siberian Platform (1989). Novosibirsk: SNIIGGIMS, 40 p. (In Russ.)
- Donskaya T.V. (2020). Assembly of the Siberian Craton: Constraints from Paleoproterozoic granitoids. *Precambrian Res.*, 348 p. <https://doi.org/10.1016/j.precamres.2020.105869>
- Donskaya T.V., Gladkochub D.P., Fedorovsky V.S., Sklyarov E.V., Cho M., Sergeev S.A., Demonterova E.I., Mazukabzov A.M., Lepekhina E.N., Cheong W., Kim J. (2017). Pre-collisional (> 0.5 Ga) complexes of the Olkhon terrane (southern Siberia) as an echo of events in the Central Asian Orogenic Belt. *Gondwana Research*, 42, pp. 243–263. <https://doi.org/10.1016/j.gr.2016.10.016>
- Donskaya T.V., Gladkochub D.P. (2021). Post-collisional magmatism of 1.88–1.84 Ga in the southern Siberian Craton: An overview. *Precambrian Res.*, 367 p. <https://doi.org/10.1016/j.precamres.2021.106447>
- Fomin V.A., Vakhromeev A.G., Motova Z.L., Strunov A.V., Mashenkin D.V., Fomina V.V., Plusnin A.V. (2024). Peculiarities of geological structure and prospects of oil and gas bearing Riphean and Vendian sedimentary sequences of the south-eastern part of the Kamovsky vault of the Baikitsa antecline. *Geodinamika i tektonofizika = Geodynamics and Tectonophysics*, 15(6), pp. 1–16. (In Russ.) <https://doi.org/10.5800/GT-2024-15-6-0802>
- General stratigraphic scale. (2024). Moscow: VSEGEI. (In Russ.) https://vsegei.ru/ru/about/msk/str_scale/os_scale-03-24.pdf
- Gladkochub D.P., Donskaya T.V., Stanevich A.M., Pisarevsky S.A., Zhang S., Motova Z.L., Mazukabzov A.M., Li H. (2019). U-Pb detrital zircon geochronology and provenance of Neoproterozoic sedimentary rocks in southern Siberia: New insights into breakup of Rodinia and opening of Paleo-Asian Ocean. *Gondwana Research*, 65, pp. 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.gr.2018.07.007>
- Gorokhov I.M., Vasilieva I.M., Kuznetsov A.B., Rizvanova N.G., Konstantinova G.V. (2023). The method of stepwise dissolution in the study of isotopic chemostratigraphy and geochronology of Riphean rocks of the Baikitsky Rise. *Geokhimiya = Geochemistry*, 68(7), pp. 669–686. (In Russ.) <https://doi.org/10.31857/S0016752523070038>
- Gorokhov I.M., Kuznetsov A.B., Vasilieva I.M., Kramchaninov A.Y., Rizvanova N.G., Konstantinova G.V. (2021). Pb-Pb-age of carbonate rocks of the Kamov series, Baikitskaya antecline of the Siberian Platform. *Doklady RAN. Nauki o Zemle*, 500(1), pp. 12–17. (In Russ.) <https://doi.org/10.1134/S1028334X21090105>
- Jackson S.E., Pearson N.J., Griffin W.L., Belousova E.A. (2004). The application of laser ablation inductively coupled plasma-mass spectrometry to in situ U-Pb zircon geochronology. *Chemical Geology*, 211, pp. 47–69. <https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2004.06.017>
- Khabarov E.M., Ponomarchuk V.A., Morozova I.P., Varaksina I.V., Saraev S.V. (2002). Fluctuations of the Sea Level and Carbon Isotope Composition of Carbonates in a Riphean Petroliferous Basin on the Western Margin of the Siberian Craton (Baikit Uplift). *Russian Geology and Geophysics*, 43(3), pp. 211–239.
- Khabarov E.M., Varaksina I.V. (2011). The Structure and Depositional Environments of Mesoproterozoic Petroliferous Carbonate Complexes in the Western Siberian Craton. *Russian Geology and Geophysics*, 52(8), pp. 923–944. <https://doi.org/10.1016/j.rgg.2011.07.014>
- Kharakhinov V.V., Shlenkin S.I. (2011). Oil and gas content of Precambrian strata of East Siberia. Moscow: Nauchny Mir, 420 p. (In Russ.)
- Khrushcheva M.O., Tishin P.A., Chernyshov A.I. (2019). Geochemical characterization of brines and modern evaporites of the Taloe Ozero tract (Republic of Khakassia). *Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo*

universitata. Series of Earth Sciences, 30, pp. 130–140. (In Russ.) <https://doi.org/10.26516/2073-3402.2019.30.130>

Kraevsky B.G., Yakshin M.S., Nagovitsyn K.E. (2018). Regional stratigraphic scheme of the Riphean deposits of the western part of the Siberian platform. *Geologiya i mineral'no-syr'yevyye resursy Sibiri = Geology and mineral resources of Siberia*, (5), pp. 4–14. (In Russ.)

Kvachko S.K., Kozyaev A.A. (2017). Sedimentation conditions of the Vanavara and Oskobinskaya formations within one of the fields in Eastern Siberia. *Modern problems of sedimentology in oil and gas engineering: Proc. III All-Russian scientific and practical sedimentological conference*. Tomsk: Central Scientific Research Institute of Petroleum Industry, pp. 191–194. (In Russ.)

Layout of the regional correlation stratigraphic scheme of the Vendian sediments of the Siberian Platform (2022). Novosibirsk: SNIIGiMS, 159 p. (In Russ.)

Logvinenko N.V. (1974). Petrography of sedimentary rocks (with the basics of research methodology: a textbook for students of geol. specialized universities. Moscow: Vysshaya shkola, 400 p. (In Russ.)

Melnikov N.V. (1982). Correlation of subsalt oil-and-gas bearing sediments in the south of the Siberian Platform. *Geologiya i geofizika = Geology and Geophysics*, (3), pp. 29–41. (In Russ.)

Melnikov N.V. (2018). Vendian-Cambrian saline basin of the Siberian Platform (Stratigraphy, history of development). 2nd ed. Novosibirsk: SNIIGiMS, 177 p. (In Russ.)

Melnikov N.V., Yakshin M.S., Shishkin B.B., Efimov A.O., Karlova G.A. (2005). Stratigraphy of oil and gas bearing basins of Siberia. Riphean and Vendian of the Siberian Platform and its folded frame. Ed. A.E. Kontorovich. Novosibirsk: Geo, 428 p. (In Russ.)

Melnikov N.V., Yakshin M.S., Shishkin B.B., Efimov A.O., Karlova G.A., Kilina L.I., Konstantinova L.N., Kochnev B.B., Kraevsky B.G., Melnikov P.N., Nagovitsyn K.E., Postnikov A.A., Ryabkova L.V., Terleev A.A., Khabarov E.M. (2005). Stratigraphy of oil and gas basins of Siberia. Riphean and Vendian Siberian Platform and its folded framing. Novosibirsk: Geo, 428 p. (In Russ.)

Methodological recommendations for correlation of well sections (2013). Edited by I.S. Gutman. Moscow: Nedra, 112 p. (In Russ.)

Motova Z.L., Plusnin A.V. (2022). Sources of matter and sedimentation conditions of Vendian terrigenous rocks in the south of the Nepsko-Botuobinskaya anteklise (Siberian Platform). *Geodinamika i tektonofizika = Geodynamics and Tectonophysics*, 13(5). (In Russ.) <https://doi.org/10.5800/GT-2022-13-5-0670>

Nesbitt H.W., Young G.M. (1982). Early Proterozoic climates and plate motions inferred from major element chemistry of lites. *Nature*, 299, pp. 715–717. <https://doi.org/10.1038/299715a0>

Paces J.B., Miller J.D. (1993). Precise U-Pb Ages of the Duluth Complex and Related Mafic Intrusions, Northeastern Minnesota: Geochronological Insights to Physical, Petrogenetic, Paleomagnetic, and Tectonomagmatic Processes Associated With the 1.1 Ga Midcontinent Rift System. *Journal of Geophysical Research*, 98, pp. 13997–14013. <https://doi.org/10.1029/93JB01159>

Pettijohn F.I., Potter P.E., Siever R. (1972). Sand and sandstone: New York, Springer, 618 p. <https://doi.org/10.1007/978-1-4615-9974-6>

Plusnin A.V., Motova Z.L., Valeev R.R., Tomilina E.M., Fomin V.V. (2024). Composition and conditions of formation of terrigenous rocks of the Nepskaya Formation of Vendian age in the central part of the Nepsko-Botuobinskaya Anticline (based on the results of core studies of well VCh-3X). *Geosfermye issledovaniya = Geospheric Research*, in revision. (In Russ.)

Powerman V.I., Buyantuev M.D., Ivanov A.V. (2021). A Review of Detrital Zircon Data Treatment, and Launch of a New Tool 'Dezirteer' along with the Suggested Universal Workflow. *Chemical Geology*, 583, pp. 119–139. <https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2021.120437>

Priyatkina N.S., Kuznetsov N.B., Rudko S.V., Shatsillo A.V., Khudoley A.K., Romaniuk T.V., Maslov A.V. (2019) The Pogoryu Formation of the Proterozoic of the Yenisei Ridge: age and sources of drift according to U-Pb-isotope dating of clastic zircons. *Doklady RAN*, 484, pp. 195–199. (In Russ.) <https://doi.org/10.1134/S1028334X19010136>

Rojas-Agramonte Y. Kröner A., Demoux A., Xia X., Wang W., Donskaya T., Liu D., Sun M. (2011). Detrital and xenocrystic zircon ages from Neoproterozoic to Palaeozoic arc terranes of Mongolia: Significance for the origin of crustal fragments in the Central Asian Orogenic Belt. *Gondwana Research*, 19(3), pp. 751–763. <https://doi.org/10.1016/j.gr.2010.10.004>

Rollinson H.R. (1994). Using geochemical data: evaluation, presentation, interpretation. Essex. London Group UK Ltd, 352 p.

Romanov M., Sovetov Y.K., Vernikovskiy V.A., Rosenbaum G., Wilde S.A., Vernikovskaya A.E., Matushkin N.Yu., Kadilnikov P.I. (2021). Late Neoproterozoic evolution of the southwestern margin of the Siberian Craton:

evidence from sedimentology, geochronology and detrital zircon analysis. *International Geology Review*, 63(13), 1658–1681. <https://doi.org/10.1080/00206814.2020.1790044>

Samsonov A.V., Postnikov A.V., Spiridonov V.A., Larionova Y.O., Larionov A.N., Travin A.V., Postnikova O.V., Solovieva N.V., Sabirov I.A., Spiridonov I.V. (2021). Neoarchean granitoids in the west of the Tunguska superterrane, the basement of the Siberian Platform: geochronology, petrology, and tectonic significance. *Petrologiya = Petrology*, 29(5), pp. 451–477. (In Russ.) <https://doi.org/10.1134/S0869591121050064>

Sovetov Y.K. (2018). Sedimentology and stratigraphic correlation of Vendian sediments in the southwestern Siberian Platform: outstanding contribution of an external source of clastic material to the formation of sedimentary systems. *Litosfera = Lithosphere*, 18(1), pp. 20–45. (In Russ.) <https://doi.org/10.24930/1681-9004-2018-18-1-020-045>

Stern R.A., Bodorkos S., Kamo S.L., Hickman A.H., Corfu F. (2009). Measurement of SIMS Instrumental Mass Fractionation of Pb Isotopes During Zircon Dating. *Geostandards and Geoanalytical Research*, 33, pp. 145–168. <https://doi.org/10.1111/j.1751-908X.2009.00023.x>

Wiedenbeck M., Alle P., Corfu F., Griffin W.L., Meier M., Oberli F., Von Quadt A., Roddick, J.C., Spiegel W. (1995). Three natural zircon standards for U-Th-Pb, Lu-Hf, trace element and REE analyses. *Geostandards Newsletter*, 19, pp. 1–23. <https://doi.org/10.1111/j.1751-908X.1995.tb00147.x>

Zaitseva, T.S., Kuznetsov, A.B., Ivanova, N.A., Maslennikov, M.A., Pustynnikova, V.V., Turchenko, T.L., Nagovitsyn, K.E. (2019). Rb-Sr-age of Riphean glauconites of the Riphean glauconites of the Kamov series, Baikitsa anteklise of the Siberian Platform. *Doklady RAN*, 488(1), pp. 52–57. (In Russ.) <https://doi.org/10.31857/S0869-5652488152-57>

Zaitseva, T.S., Priyatkina, N.S., Gorokhov, I.M., Kovach, V.P., Adamskaya, E.V., Gorokhovskiy, B.M., Plotkina, Y.V. (2022). Clastic zircons from Riphean sediments of the Baikitsa Anteklise (Siberian platform): U-Th-Pb data. *Pustovalov Readings 2022: Proc. Conference dedicated to the 120th anniversary of Leonid Vasilievich Pustovalov*. Moscow: I.M. Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University), pp. 48–50. (In Russ.)

About the Authors

Aleksey V. Plusnin – Cand. Sci. (Geology and Mineralogy), Sedimentology Expert, UTO I&CSI, RN-KrasnoyarskNIPIneft LLC; Leading Researcher, Laboratory of Geology and Stratigraphy of Sedimentary Basins, Almet'yevsk State Technological University “Petroleum High School”
2 Lenin st., Almet'yevsk, 423450, Russian Federation
e-mail: plyusnin@agni-rt.ru

Zinaida L. Motova – Cand. Sci. (Geology and Mineralogy), Senior Researcher, Laboratory of Palaeogeodynamics, Institute of Earth Crust of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
128 Lermontova st., Irkutsk, 664033, Russian Federation
e-mail: motova@crust.irk.ru

Igor V. Afonin – Cand. Sci. (Geology and Mineralogy), Senior Researcher, Research Laboratory of Structural Petrology and Minerageny, National Research Tomsk State University
36 Lenin ave., Tomsk, 634050, Russian Federation
e-mail: heaven05@list.ru

Elena M. Tomilina – Senior Lecturer, Department of Mineralogy and Petrography, Perm State National Research University
15 Bukirev st., Perm, 614990, Russian Federation
e-mail: tomilinaelena.psu@yandex.ru

Dmitriy A. Staroselets – Deputy General Director for Development, GudGeo LLC
57 Respublika st., Tyumen, 625000, Russian Federation
e-mail: d_star1997@mail.ru

Evgeny E. Belozеров – Leading Specialist, Geological Exploration Department, Department of Geological Exploration, Resource Base and Licensing, East Siberian Oil and Gas Company JSC

36 Mira ave., Krasnoyarsk, 660049, Russian Federation
e-mail: BelozerovEE@vsnk.ru

Irik R. Khalikov – Head of Geological Exploration Department, Department of Geological Exploration, Resource Base and Licensing, East Siberian Oil and Gas Company JSC

36 Mira ave., Krasnoyarsk, 660049, Russian Federation
e-mail: HalikovIR@vsnk.rosneft.ru

Mikhail V. Shaldybin – Cand. Sci. (Geology and Mineralogy), Head of Sedimentology Group, TomskNIPIneft JSC

72 Prospekt Mira, Tomsk, 634027, Russian Federation
e-mail: ShaldybinMV@tomsknipi.ru

Igor A. Yashin – Cand. Sci. (Geology and Mineralogy), Head of Regional Geology and Geological Exploration Department, RN-KrasnoyarskNIPIneft LLC

65, 9 Maya st., Krasnoyarsk, 660098, Russian Federation
e-mail: YashinIA@knipi.rosneft.ru

Vladimir A. Fomin – Postgraduate student, Institute of Earth Crust of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

128, Lermontova st., Irkutsk, 664033, Russian Federation
e-mail: fovarid@gmail.com

Manuscript received 18 October 2024;

Accepted 10 March 2025; Published 30 March 2025

© 2025 The Authors. This article is published in open access under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)